

ラベプラゾールNa錠「トワ」

を服用される患者さんへ

このお薬について

このお薬は胃潰瘍、十二指腸潰瘍や逆流性食道炎などの治療薬です。胃粘膜のプロトンポンプを阻害し胃酸の分泌を抑える作用があり、胃や十二指腸の潰瘍を改善し、逆流性食道炎にともなう痛みや胸やけなどをやわらげます。

このお薬は次のようにお飲みください

- お薬は、**かんだり、砕いたりせず**に飲んでください。
- お薬は、コップ1杯ぐらいの水(またはぬるま湯)で飲んでください。
- 主治医の指示に従い、毎日決められた分量を決められた時間に飲んでください。
- 飲み忘れたときは、気がついたときにすぐに飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は、1回分とばして次に飲む時間に1回分を飲むようにしてください。**絶対に2回分を一度に飲まないでください。**
- あなたの症状が良くなった場合でも、主治医の指示なしに、ご自分でお薬を減らしたり、止めないでください。

裏面もお読みください。

次のことに注意してください


- 妊娠または授乳中の方は、飲む前に必ず主治医または薬剤師に相談してください。
- 以前にお薬を飲んで、**かゆみ、発疹などが出たことがある方、肝臓に病気のある方は**、飲む前に必ず主治医または薬剤師に相談してください。
- **他のお薬を飲んでいる場合は**、薬局・薬店で買ったお薬も含め、主治医または薬剤師に伝えてください。
特に、**アタザナビル硫酸塩（商品名：レイアタッツ®）というお薬を飲んでいる場合**、そのお薬の作用を弱めることがありますので、必ず主治医または薬剤師に伝えてください。



その他、下記の点にご留意ください

- お薬は以下のように保管してください。
 - ・ 直射日光のあたらない涼しいところで湿気を避けて保管してください。
 - ・ こどもの手が届かないところで保管してください。
- 気になる症状が現れた場合は、主治医または薬剤師に相談してください。

病院・薬局等、医療提供施設名



この指導せんの内容は音声コードにしています。活字文書読み上げ装置に通すことで、音声として聞くことができます。



東和薬品株式会社