

ランソプラゾールOD錠「トーア」

を服用されている方へ

薬の外観について

- 赤橙色の粒々には有効成分が含まれています。有効成分は胃酸で分解されるため、粒々は胃で溶けずに腸で溶けるよう工夫しています。

かまずにお飲みください。



15mg錠

30mg錠

- 表面の粒々は不均一に見えることがあります、入っている薬の量は同じで、効き目に変わりはありません。

**この薬は水なしでも飲むことができる
口腔内崩壊錠(OD錠)です**

水なしで飲む場合

舌の上で、だ液を含ませ舌で軽くつぶすようにして溶かしてください。薬の中に含まれている粒々はかまずにだ液と一緒に飲み込んでください。

- 普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。
- 水なしで飲んでも水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで飲む場合は、寝たまま飲まないでください。

裏面もお読みください。

飲むときの注意

- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。
- この薬を飲んで、体調が悪くなった時は、飲むのを止めて、すぐに医師又は薬剤師に相談してください。
- 直射日光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 誤って飲んでしまわないよう、子供の手の届かないところに保管してください。

施設名



東和薬品株式会社

2016年2月改訂 (C-3)