

リスペリドンOD錠「トーフ」

を服用される患者さんへ

このお薬は次のように飲んでください

○このお薬は、水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲みこんでください。

○普通のお薬と同じように、水（又はぬるま湯）で飲むこともできます。

※このお薬を飲むときには、だ液又は水と一緒に飲みこんでください。

※寝たままの状態では、水なしで飲まないようにしてください（食道に付着して炎症を起こすことが考えられます）。

○飲み忘れたときは、気がついたときに1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が5時間以内の場合は、1回分とばして次回から指示どおりに飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲まないでください。**

○症状が良くなっても、医師の指示なしに、ご自分でお薬を減らしたり止めたりせず、医師の指示に従ってください。

裏面もお読みください。

このお薬は以下のように保管してください

- 湿気をさけて、直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- こどもの手の届かないところに保管してください。

このお薬を飲んでいる間は次の点に注意してください

- このお薬を飲むと、**眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下**が起こることがありますので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作**は行わないでください。
また、症状が強いときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 飲酒により薬の作用が強くあらわれることがあります**ので、服用中の飲酒は控えてください。
- 白内障の手術**を受ける際には、このお薬を飲んでいる、または飲んでいたことを、眼科の先生にお伝えください。

施設名



東和薬品株式会社