

# リセドロン酸Na錠17.5mg「トローワ」 を服用されている方へ

**この薬は週 1 回 1 錠飲む薬です。  
(毎日飲む薬ではありません。)**

1週間のうち都合の良い日を決めて、薬を飲む曜日に○を付けてください。

日	月	火	水	木	金	土
---	---	---	---	---	---	---

毎週 1 回、決めた曜日に 1 錠を下記の手順で飲んでください。

**朝、起きたとき(食事  
前)**に、1錠をコップ1  
杯(約180mL)の**水注)**  
で飲んでください。



飲んでから**30分間は横  
にならず、水以外の飲  
食、他の薬の服用はさ  
けてください。**

注) 水道水や市販の水(Ca、Mg等の  
含量の特に高いミネラルウォーター  
を除く)で飲んでください。

**30  
分後**



この薬をかんだり、  
口の中で溶かしたりしないでください。

薬を  
飲み忘れた  
とき

- 気づいた日の翌朝に1錠を飲んでください。  
(次からは、決められた日に飲んでください。)
- 決して同じ日に2錠を飲まないでください。

裏面もお読みください。

この薬の服用により、以下のような症状があらわれることがあります。

- 食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じる など
- あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき など
- 外耳炎、耳だれ、耳の痛みが続く など
- 太ももや太ももの付け根の痛み
- 体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなる など

このような症状があらわれたり、異常を感じた場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

この薬のようなビスホスホネート系薬剤によるあごの骨の異常についての報告の多くは、薬を服用中に抜歯した場合や歯のインプラント<sup>※</sup>をした場合に発生しています。

**この薬を服用されている患者さんで歯科治療を受けられる方は、必ず歯科医、口腔外科医にこの薬を服用していることをお申し出ください。**

※入れ歯とは異なり、人工的な歯の根をあごに埋めて、その上に人工の歯を取り付ける治療方法です。

施設名

携帯電話用  
お薬の情報



[http://twyh.jp/  
ris-t17.5a/](http://twyh.jp/ris-t17.5a/)

東和薬品株式会社