リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」を服用されている方へ

この薬は週１回１錠飲む薬です。
（毎日飲む薬ではありません。）

1週間のうち都合の良い日を決めて、薬を飲む曜日に○を付けてください。

日	月	火	水	木	金	土

毎週１回、決めた曜日に１錠を下記の手順で飲んでください。

朝、起きたとき**（食事前）**に、1錠をコップ1杯（約180mL）の**水**注）で飲んでください。

注）水道水や市販の水（Ca、Mg等の含量の特に高いミネラルウォーターを除く）で飲んでください。

飲んでから**30分間は横にならず、水以外の飲食、他の薬の服用はさけて**ください。

30分後

この薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。

薬を飲み忘れたとき

○その日は飲まないで次の朝に1錠のんでください。
（何も飲食物をとっておらず、他の薬も飲んでいない場合は、気がついたときにすぐに1錠飲んでください。）
その後はあらかじめ決められた日に飲んでください。
○決して同じ日に2錠を飲まないでください。

裏面もお読みください。

この薬の服用により、以下のような症状があらわれることがあります。

- 食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じる　など
- 体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなる　など
- あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき　など
- 外耳炎、耳だれ、耳の痛みが続く　など
- 太ももや太ももの付け根の痛み

このような症状があらわれたり、異常を感じた場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

歯科治療を受けられる方は、必ず歯科医、口腔外科医にこの薬を服用していることをお申し出ください。
ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ち、定期的に歯科検査を受けてください。

施設名

東和薬品株式会社

2023年9月改訂（C-6）
DC-003979_01