

# レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」 を服用される患者さんへ

この薬には、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する働きがあります。

この薬は決められた量を**「1日1回」**服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善することが期待できます。

## 服用にあたっての注意事項

- 抗菌薬は医師または薬剤師の指示どおりに服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性もあります。
- 飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、次回から服用するようにしてください。  
**絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。**
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください

裏面もお読みください。

# レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」について

この薬はパイナップル風味の のみ薬 です。

- ①右の図のように、「押さえる」マークを持って、開封口から開けてください。

※注意

他の部分を持って開封すると  
中身が飛び出ることがあります。



- ②ゆっくり開封口から薬を飲んで  
ください。

※注意

切り口で口の中を傷つけないようにご注意ください。  
開封後はすみやかに全量を飲んでください。

- ・コップ1杯くらいの水などに混ぜて飲むこともできます。
- ・混ぜた後は、なるべく早く飲んでください。
- ・茶葉抽出飲料(緑茶、紅茶、ウーロン茶)およびコーラに混ぜると沈殿が生じるので、混ぜないようにしてください。

次の点に注意してください。

- ・高温を避けて保管してください。
- ・お子さまの手の届かないところに保管してください。
- ・のみ薬ですので、飲む以外の用途で使用しないでください。

施設名



東和薬品株式会社

2014年12月作成(C-1)