

ロラタジンDS1%「トローワ」の 上手な飲ませ方

監修：獨協医科大学 小児科学 准教授 吉原重美 先生

● ロラタジンDS1%「トローワ」は甘みをつけたお薬です ●

お水で飲ませるときは…

- 小さじ1杯程度(5cc程度)のお水に1回分のお薬を加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。
このお水の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。
- このお薬は、お水に溶けませんが混ざります。
- お薬を飲ませたあとは、さらにお水を飲ませてあげると、口の中がすっきりします。



お薬を混ぜた場合

- 飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- 作り置きしないでください。

裏面もお読みください

施設名

携帯電話用
お薬の情報



<http://twyh.jp/lor-ds/>



東和薬品株式会社

お水で飲みにくいときは…



お水のかわりに次のような飲みものや食べものと混ぜると、飲みやすくなります。

(薬局にてボランティア10名の協力による)



ヨーグルト
(加糖)



牛乳



バニラ
アイスクリーム



ミルク
ココア



プリン



次のようなものと一緒に飲むと、苦くなります。
お薬の服用前後に飲んでも、苦くなる可能性があります。



スポーツ
ドリンク



酸味のある
ジュース



乳酸菌
飲料

保管について

直射日光や湿気を避けて、室温で保管してください。