

ロラタジンOD錠10mg「トーア」

を服用される患者さんへ



普通の薬と同じようにシートから押し出してください。

○この薬は体内的アレルギーを引き起こす物質の働きや反応を抑えて、アレルギー性鼻炎やじんま疹、湿疹など皮膚のかゆみをおさえる薬です。

※アレルギーの原因を取り除く薬ではありません。

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

水なしで飲む場合

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)

裏面もお読みください。

ロラタジンOD錠10mg「トーア」

を服用される患者さんへ



普通の薬と同じようにシートから押し出してください。

○この薬は体内的アレルギーを引き起こす物質の働きや反応を抑えて、アレルギー性鼻炎やじんま疹、湿疹など皮膚のかゆみをおさえる薬です。

※アレルギーの原因を取り除く薬ではありません。

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

水なしで飲む場合

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)

裏面もお読みください。

ロラタジンOD錠10mg「トーア」

を服用される患者さんへ



普通の薬と同じようにシートから押し出してください。

○この薬は体内的アレルギーを引き起こす物質の働きや反応を抑えて、アレルギー性鼻炎やじんま疹、湿疹など皮膚のかゆみをおさえる薬です。

※アレルギーの原因を取り除く薬ではありません。

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

水なしで飲む場合

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)

裏面もお読みください。

ロラタジンOD錠10mg「トーア」

を服用される患者さんへ



普通の薬と同じようにシートから押し出してください。

○この薬は体内的アレルギーを引き起こす物質の働きや反応を抑えて、アレルギー性鼻炎やじんま疹、湿疹など皮膚のかゆみをおさえる薬です。

※アレルギーの原因を取り除く薬ではありません。

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

水なしで飲む場合

- 舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
- 水で飲んだ場合と効き目は変わりません。
- 水なしで寝たまま飲まないでください。
(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)

裏面もお読みください。

この薬は以下のように保管してください

- 直射日光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。

この薬を飲んでいる間は次の点にご注意ください

- 医師の指示通りに1日1回、決められた量を食後に飲んでください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。
- 飲み忘れた場合は気がついたときにすぐに飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近いときは、1回とばしてください。
2回分を一度に飲まないでください。
- 服用中の薬がある場合や、誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 服用中に何か異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

施設名

東和薬品株式会社

2019年2月改訂(C-3)

この薬は以下のように保管してください

- 直射日光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。

この薬を飲んでいる間は次の点にご注意ください

- 医師の指示通りに1日1回、決められた量を食後に飲んでください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。
- 飲み忘れた場合は気がついたときにすぐに飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近いときは、1回とばしてください。
2回分を一度に飲まないでください。
- 服用中の薬がある場合や、誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 服用中に何か異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

施設名

東和薬品株式会社

2019年2月改訂(C-3)

この薬は以下のように保管してください

- 直射日光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。

この薬を飲んでいる間は次の点にご注意ください

- 医師の指示通りに1日1回、決められた量を食後に飲んでください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。
- 飲み忘れた場合は気がついたときにすぐに飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近いときは、1回とばしてください。
2回分を一度に飲まないでください。
- 服用中の薬がある場合や、誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 服用中に何か異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

施設名

東和薬品株式会社

2019年2月改訂(C-3)

施設名

東和薬品株式会社

2019年2月改訂(C-3)