

- ☐ アクトネル錠
- ☐ ダイドロネル錠
- ☐ フォサマック錠
- ☐ ベネット錠
- ☐ ボナロン
(錠・経口ゼリー・点滴静注)
- ☐ ボノテオ錠
- ☐ リカルボン錠
- ☐ ソメタ点滴静注
- ☐ ボンピバ(静注・錠)
- ☐ リクラスト点滴静注液
- ☐ アレンドロン酸ナトリウム
(錠・点滴静注)
- ☐ ミノドロン酸錠
- ☐ リセドロン酸ナトリウム錠
- ☐ ソレドロン酸点滴静注液
- ☐ パミドロン酸2Na点滴静注用
- ☐ イバンドロン酸ナトリウム(静注)
- ☐ その他

年 月 日から **ビスホスホネート系薬剤**
(年 月 日まで) を使用しています



歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんはビスホスホネート系薬剤の治療を受けているか、治療を受けたことがあります。

- 顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがあるので、抜歯等の侵襲的歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の要否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合すみやかに受診するようにご説明ください。
- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。

TOWA DC-002741_01 (C-5)
2022年10月改訂

歯科・口腔外科を受診する場合は
このカードをご提示ください

私はビスホスホネート系薬剤による
治療を受けています

病院名・薬局名(連絡先)

- ☐ アクトネル錠
- ☐ ダイドロネル錠
- ☐ フォサマック錠
- ☐ ベネット錠
- ☐ ボナロン
(錠・経口ゼリー・点滴静注)
- ☐ ボノテオ錠
- ☐ リカルボン錠
- ☐ ソメタ点滴静注
- ☐ ボンピバ(静注・錠)
- ☐ リクラスト点滴静注液
- ☐ アレンドロン酸ナトリウム
(錠・点滴静注)
- ☐ ミノドロン酸錠
- ☐ リセドロン酸ナトリウム錠
- ☐ ソレドロン酸点滴静注液
- ☐ パミドロン酸2Na点滴静注用
- ☐ イバンドロン酸ナトリウム(静注)
- ☐ その他

年 月 日から **ビスホスホネート系薬剤**
(年 月 日まで) を使用しています



歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんはビスホスホネート系薬剤の治療を受けているか、治療を受けたことがあります。

- 顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがあるので、抜歯等の侵襲的歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の要否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合すみやかに受診するようにご説明ください。
- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。

TOWA DC-002741_01 (C-5)
2022年10月改訂

歯科・口腔外科を受診する場合は
このカードをご提示ください

私はビスホスホネート系薬剤による
治療を受けています

病院名・薬局名(連絡先)

- ☐ アクトネル錠
- ☐ ダイドロネル錠
- ☐ フォサマック錠
- ☐ ベネット錠
- ☐ ボナロン
(錠・経口ゼリー・点滴静注)
- ☐ ボノテオ錠
- ☐ リカルボン錠
- ☐ ソメタ点滴静注
- ☐ ボンピバ(静注・錠)
- ☐ リクラスト点滴静注液
- ☐ アレンドロン酸ナトリウム
(錠・点滴静注)
- ☐ ミノドロン酸錠
- ☐ リセドロン酸ナトリウム錠
- ☐ ソレドロン酸点滴静注液
- ☐ パミドロン酸2Na点滴静注用
- ☐ イバンドロン酸ナトリウム(静注)
- ☐ その他

年 月 日から **ビスホスホネート系薬剤**
(年 月 日まで) を使用しています



歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんはビスホスホネート系薬剤の治療を受けているか、治療を受けたことがあります。

- 顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがあるので、抜歯等の侵襲的歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の要否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合すみやかに受診するようにご説明ください。
- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。

TOWA DC-002741_01 (C-5)
2022年10月改訂

歯科・口腔外科を受診する場合は
このカードをご提示ください

私はビスホスホネート系薬剤による
治療を受けています

病院名・薬局名(連絡先)

- ☐ アクトネル錠
- ☐ ダイドロネル錠
- ☐ フォサマック錠
- ☐ ベネット錠
- ☐ ボナロン
(錠・経口ゼリー・点滴静注)
- ☐ ボノテオ錠
- ☐ リカルボン錠
- ☐ ソメタ点滴静注
- ☐ ボンピバ(静注・錠)
- ☐ リクラスト点滴静注液
- ☐ アレンドロン酸ナトリウム
(錠・点滴静注)
- ☐ ミノドロン酸錠
- ☐ リセドロン酸ナトリウム錠
- ☐ ソレドロン酸点滴静注液
- ☐ パミドロン酸2Na点滴静注用
- ☐ イバンドロン酸ナトリウム(静注)
- ☐ その他

年 月 日から **ビスホスホネート系薬剤**
(年 月 日まで) を使用しています



歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんはビスホスホネート系薬剤の治療を受けているか、治療を受けたことがあります。

- 顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがあるので、抜歯等の侵襲的歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の要否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合すみやかに受診するようにご説明ください。
- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。

TOWA DC-002741_01 (C-5)
2022年10月改訂

歯科・口腔外科を受診する場合は
このカードをご提示ください

私はビスホスホネート系薬剤による
治療を受けています

病院名・薬局名(連絡先)

 **これからこの薬剤で
治療される患者さんへ**

- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり抜歯などの歯科治療は、この薬剤の治療を始める前に済ませてください。

 この薬剤で治療中の患者さんへ

- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
 - 定期的な歯科検査を受けてください。
 - 抜歯などの治療はできるかぎり避けるようにしてください。
- 

- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。

- あごの痛み
- 歯のゆるみ
- 歯ぐきの腫れ など

 **これからこの薬剤で
治療される患者さんへ**

- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり抜歯などの歯科治療は、この薬剤の治療を始める前に済ませてください。

 この薬剤で治療中の患者さんへ

- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
 - 定期的な歯科検査を受けてください。
 - 抜歯などの治療はできるかぎり避けるようにしてください。
- 

- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。

- あごの痛み
- 歯のゆるみ
- 歯ぐきの腫れ など

 **これからこの薬剤で
治療される患者さんへ**

- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり抜歯などの歯科治療は、この薬剤の治療を始める前に済ませてください。

 この薬剤で治療中の患者さんへ

- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
 - 定期的な歯科検査を受けてください。
 - 抜歯などの治療はできるかぎり避けるようにしてください。
- 

- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。

- あごの痛み
- 歯のゆるみ
- 歯ぐきの腫れ など

 **これからこの薬剤で
治療される患者さんへ**

- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり抜歯などの歯科治療は、この薬剤の治療を始める前に済ませてください。

 この薬剤で治療中の患者さんへ

- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
 - 定期的な歯科検査を受けてください。
 - 抜歯などの治療はできるかぎり避けるようにしてください。
- 

- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。

- あごの痛み
- 歯のゆるみ
- 歯ぐきの腫れ など