


アジスロマイシン細粒小児用10%「トーフ」 の飲ませ方

- このくすりは抗生物質です。
- 3日間飲むと、約7日間作用が持続します。医師の指示に従い、正しく服用してください。



- 飲み始めて4日目以降でも症状の改善が見られない場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- このくすりの重複投与を避けるため、他の医療機関を受診する場合はアジスロマイシン細粒を飲んでいただことを伝えてください。

保管について

- 直射日光や湿気を避けて、室温で保管してください。
- 誤って飲んでしまわないよう、子供の手の届かないところに保管してください。

(裏面もお読み下さい)

基本的には水で飲ませるくすりです

飲みにくいときは

- そのままで飲みにくい場合は少量の水と混ぜて飲ませることもできます。少量の水(10~20cc程度)に1回分のくすりを加え、軽くかき混ぜてから飲ませてください。水の量は目安です。お好みに合わせて調節してください。

このくすりは
いちご
風味です



一緒に飲むと…



苦味が出にくいもの



アイス
クリーム



ココア



プリン



苦味が出るもの



スポーツドリンク



酸味のある
ジュース

口の中に残ったくすりが苦くなることがあります。
くすりを飲ませた後は、すぐに水を飲ませてあげるとよいでしょう。

くすりを混ぜる場合の注意

- 飲ませる直前に1回分を混ぜてください。
- 作り置きしないでください。

