

体重別小児投与量早見表

プラナルカストDS10%「トローツ」

体重 (kg)	有効成分として	DSとして
	1日量(mg) (7mg/kg) 〔2回に分割〕	1日量(g) (70mg/kg) 〔2回に分割〕
8	56	0.56
10	70	0.70
12	84	0.84
14	98	0.98
16	112	1.12
18	126	1.26
20	140	1.40
22	154	1.54
24	168	1.68
26	182	1.82
28	196	1.96
30	210	2.10
32	224	2.24
34	238	2.38
36	252	2.52
38	266	2.66
40	280	2.80

【用法・用量】

通常、小児にはプラナルカスト水和物として1日量7mg/kg(ドライシロップとして70mg/kg)を朝食後および夕食後の2回に分け、用時懸濁して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。1日最高用量はプラナルカスト水和物として10mg/kg(ドライシロップとして100mg/kg)とする。ただし、プラナルカスト水和物として成人の通常の用量である450mg/日(ドライシロップとして4.5g/日)を超えないこと。

体重別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回、朝食後および夕食後に経口投与する。

体 重	ドライシロップ1回量
12kg以上18kg未満	0.5g(プラナルカスト水和物として50mg)
18kg以上25kg未満	0.7g(プラナルカスト水和物として70mg)
25kg以上35kg未満	1.0g(プラナルカスト水和物として100mg)
35kg以上45kg未満	1.4g(プラナルカスト水和物として140mg)

【使用上の注意】小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児に対する安全性は確立していない。(低出生体重児、新生児に対しては使用経験がなく、乳児に対しては使用経験が少ない)

●その他の詳細につきましては製品添付文書をご参照ください●