

カンデサルタン錠 2mg 「トーワ」
カンデサルタン錠 4mg 「トーワ」
カンデサルタン錠 8mg 「トーワ」
カンデサルタン錠 12mg 「トーワ」

【この薬は？】

販売名	カンデサルタン錠 2mg 「トーワ」 CANDESARTAN TABLETS 2mg “TOWA”	カンデサルタン錠 4mg 「トーワ」 CANDESARTAN TABLETS 4mg “TOWA”	カンデサルタン錠 8mg 「トーワ」 CANDESARTAN TABLETS 8mg “TOWA”	カンデサルタン錠 12mg 「トーワ」 CANDESARTAN TABLETS 12mg “TOWA”
一般名	カンデサルタン シレキセチル Candesartan Cilexetil			
含有量 (1錠中)	2mg	4mg	8mg	12mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、血管を収縮する作用のあるアンジオテンシンⅡと呼ばれる物質の働きを抑えることで血圧を下げます。

- ・次の病気の人に処方されます。

高血圧症	カンデサルタン錠 2mg、4mg、
腎実質性高血圧症	8mg、12mg 「トーワ」
下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 慢性心不全（軽症～中等症）	カンデサルタン錠 2mg、4mg、8mg 「トーワ」

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にカンデサルタン シレキセチル製剤に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・アリスキレンフマル酸塩（ラジレス）を使用している糖尿病の人（ただし、他の血圧を下げる治療を並行して行ってもなおお血圧のコントロールが著しく不良の人を除く）

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・腎動脈狭窄のある人
- ・高カリウム血症の人
- ・腎臓に障害のある人
- ・肝臓に障害のある人
- ・過去に薬剤で過敏な反応を経験したことがある人
- ・高齢の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

〔高血圧症の場合〕

販売名	カンデサルタ ン錠 2mg 「トーワ」	カンデサルタ ン錠 4mg 「トーワ」	カンデサルタ ン錠 8mg 「トーワ」	カンデサルタ ン錠 12mg 「トーワ」
1 回量	4～8mg（必要に応じ 12mg まで増量されることがあります。）			
飲む回数	1 日 1 回			

腎臓に障害のある人は、1 日 1 回 2mg から開始し、必要に応じ 8mg まで増量されることがあります。

〔腎実質性高血圧症の場合〕

販売名	カンデサルタ ン錠 2mg 「トーワ」	カンデサルタ ン錠 4mg 「トーワ」	カンデサルタ ン錠 8mg 「トーワ」	カンデサルタ ン錠 12mg 「トーワ」
1 回量	2mg（必要に応じ 8mg まで増量されることがあります）			
飲む回数	1 日 1 回			

〔慢性心不全（軽症～中等症）の場合〕

販売名	カンデサルタン錠 2mg 「トーワ」	カンデサルタン錠 4mg 「トーワ」	カンデサルタン錠 8mg 「トーワ」
1 回量	4mg（必要に応じ 8mg まで増量されることがあります）		
飲む回数	1 日 1 回		

腎臓に障害のある人などは、1 日 1 回 2mg から開始します。

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気が付いた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬は腎臓に障害のある人やコントロール不良の糖尿病の人に、高カリウム血症をおこすおそれがあるので、これらの人では血液検査がおこなわれることがあります。
- ・血圧が下がることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高

所作業、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には注意してください。

- ・手術前 24 時間はこの薬を使用しないことが望ましいので、手術を受ける場合、この薬を飲んでいることを医師に伝え、医師の指示に従ってください。
- ・急激な血圧の低下（失神、意識消失、腎機能の低下（尿量が減るなど）、貧血など）があらわれることがあるので、そのような場合には、医師に連絡してください。特に次の人は十分注意してください。

[高血圧症の場合、次の人]

- ・血液透析中の人
- ・嚴重な減塩療法中の人
- ・利尿剤を使っている人（特に最近使用を開始した人）
- ・低ナトリウム血症の人
- ・腎臓に障害のある人
- ・心不全の人

[慢性心不全の場合、次の人]

- ・血液透析中の人
- ・嚴重な減塩療法中の人
- ・利尿剤を使っている人（特に最近使用を開始した人）
- ・低ナトリウム血症の人
- ・低血圧の人
- ・比較的重症度の高い慢性心不全の人

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使うことができません。
- ・この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに医師に相談してください。
- ・妊娠する可能性がある人は、医師や薬剤師に、この薬が妊婦や胎児に影響を及ぼす可能性があることについて説明を受け、十分に理解してください。
特に、妊娠の希望や予定のある人は、医師に相談してください。
- ・授乳中の方は、授乳を中止してください。

薬の影響を心配する女性に対し、妊娠と薬情報センターで相談に応じています。
さらに詳しい説明を希望される場合には妊娠と薬情報センターにご相談ください。

《妊娠と薬情報センター》

(国立成育医療研究センター) 電話：03-5494-7845

- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
血管浮腫 けっかんふしゅ	まぶたのはれ、唇のはれ、舌のはれ、息苦しい、じんましん
ショック ショック	冷や汗、めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、血の気が引く、息切れ、判断力の低下
失神 しっしん	気を失う
意識消失 いしきしょうしつ	意識がなくなる、考えがまとまらない、気を失う
急性腎不全 きゅうせいじんふぜん	からだがだるい、からだのむくみ、疲れやすい、意識の低下、頭痛、眼がはれぼったい、息苦しい、尿がでない、尿量が減る
高カリウム血症 こうカリウムけっしょう	唇がしびれる、手足が動きづらい、手足に力が入らない、手足のしびれ、手足のまひ、筋肉が衰える、筋力の減退
肝機能障害 かんきのうしょうがい	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	発熱、のどの痛み
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	から咳、息苦しい、息切れ、発熱
低血糖 ていけつとう	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、頭痛、動悸（どうき）、空腹感、手足のふるえ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷や汗、からだがだるい、からだのむくみ、疲れやすい、発熱、脱力感、ふらつき
頭部	めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、意識がなくなる、意識の低下、頭痛
顔面	血の気が引く
眼	まぶたのはれ、眼がはれぼったい、白目が黄色くなる
口や喉	唇のはれ、舌のはれ、唇がしびれる、吐き気、嘔吐（おうと）、のどの痛み、から咳

部位	自覚症状
胸部	息苦しい、息切れ、吐き気、動悸（どうき）
腹部	食欲不振、吐き気、空腹感
手・足	手足が動きづらい、手足に力が入らない、手足のしびれ、手足のまひ、手足のこわばり、手足のふるえ
皮膚	じんましん、かゆみ、皮膚が黄色くなる
筋肉	筋肉が衰える、筋力の減退、筋肉の痛み
尿	尿がでない、尿量が減る、尿の色が濃くなる、尿が赤褐色～褐色になる
その他	判断力の低下、気を失う

【この薬の形は？】

販売名	カンデサルタン錠 2mg「トーワ」	カンデサルタン錠 4mg「トーワ」	カンデサルタン錠 8mg「トーワ」	カンデサルタン錠 12mg「トーワ」
PTP シート	表 	表 	表 	表 
	裏 	裏 	裏 	裏 
形状	素錠 	素錠（割線入り） 	素錠（割線入り） 	素錠（割線入り） 
錠径	5.5mm	7.0mm	7.0mm	7.0mm
厚さ	2.1mm	2.6mm	2.6mm	2.6mm
重さ	65mg	130mg	130mg	130mg
色	白色～帯黄白色	白色～帯黄白色	ごくうすい だいだい色	うすいだいだい色
本体 表示	表 カンデサルタン	カンデ 4	カンデ 8	カンデ 12
	裏 2 トーワ	カンデ 4 サルタン トーワ	カンデ 8 サルタン トーワ	カンデ 12 サルタン トーワ

【この薬に含まれているのは？】

販売名	カンデサルタン錠 2mg 「トーワ」	カンデサルタン錠 4mg 「トーワ」	カンデサルタン錠 8mg 「トーワ」	カンデサルタン錠 12mg 「トーワ」
有効成分	カンデサルタン シレキセチル			
添加物	乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸トリエチル、カルメロース Ca、ステアリン酸 Mg	乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸トリエチル、黄色5号、カルメロース Ca、ステアリン酸 Mg		

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：東和薬品株式会社 (<https://www.towayakuhin.co.jp/>)

くすり相談

電話番号：0120-757-108

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他弊社の休業日を除く）