

イマチニブ錠「トローワ」を 服用される患者さんへ



100mg



200mg (原寸大)

イマチニブ錠「トローワ」は、慢性骨髄性白血病を治療する薬です。毎日服用を続けることが大切です。

服用方法

- 主治医から指示された量の薬を毎日食後に飲んでください。
- 胃などへの負担を出来るだけ少なくするため、コップ1杯(200cc程度)の多めの水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。

飲み忘れた場合

- 飲み忘れた場合は、気づいてもすぐに服用せず、次回の服用時に1回分を飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**

その他

- 主治医の指示なしに、**ご自身の判断で薬を減らしたり、止めたりしないでください。**
- めまいや眠気、目のかすみがあることがありますので、高いところでの作業、自動車の運転や危険を伴う機械を操作するときには注意してください。
- 妊娠が可能な場合、**この薬を服用している間は避妊をするようにしてください。**
- 指示された検査日を必ず守って、通院してください。

裏面も必ずご覧ください

食事・サプリメントについて

この薬の服用中は「グレープフルーツジュース」や「セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む食品」を避けてください。

副作用について

この薬を服用していると、下記のような副作用があらわれることがあります。症状に気がつきましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

吐き気、嘔吐



下痢



発疹・かゆみ



発熱・悪寒



内出血
出血しやすい

むくみ
体重増加

筋肉痛
筋けいれん

貧血
けん怠感

食欲不振

施設名



東和薬品株式会社

2015年6月作成(C-1)