

アマルエット配合錠「トーワ」

を服用される患者さんへ

1日1回の服用で、
高血圧症と高コレステロール血症、
両方の治療が可能です。

高血圧症のお薬
(アムロジピン)

高コレステロール血症のお薬
(アトルバスタチン)

アマルエット配合錠「トーワ」

1番

2番

3番

4番



- ・医師に指示された用法・用量を守ってください。
- ・湿気を避けて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- ・子どもの手の届かないところに保管してください。

裏面もお読みください。

この薬を飲むときは、以下の点にご注意ください

おう もん きん ゆう かい しょう

1 筋肉の副作用として、ごくまれに横紋筋融解症を起こすことがあります。

- 飲み始めてから、筋肉が痛い、手足の力が入らない、尿の色が濃い(赤褐色になる)等の症状に気づかれた場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

2 劇症肝炎等の肝炎、肝機能障害や黄疸があらわれることがあります。

- 恶心・嘔吐、けん怠感、皮膚や白目が黄色くなる等の症状があらわれた場合には、医師または薬剤師に連絡してください。

3 めまい、ふらつきがあらわれることがあります。

- 血圧低下により、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う機械を操作する際は十分注意してください。

- ・副作用はどんな薬にもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
- ・他にも薬を服用して体調がおかしいと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

施設名



東和薬品株式会社

2015年12月作成 (C-1)