

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2015年9月

東和薬品株式会社

広範囲経口抗菌製剤  
**レボフロキサシンOD錠250mg「トーフ」**  
**レボフロキサシンOD錠500mg「トーフ」**  
《レボフロキサシン口腔内崩壊錠》

広範囲経口抗菌製剤  
**レボフロキサシン内用液250mg「トーフ」**  
《レボフロキサシン内用液》

広範囲経口抗菌製剤  
**レボフロキサシン内用液25mg/mL「トーフ」**  
《レボフロキサシン内用液》

広範囲経口抗菌製剤  
日本薬局方  
レボフロキサシン錠  
**レボフロキサシン錠250mg「トーフ」**  
**レボフロキサシン錠500mg「トーフ」**

広範囲経口抗菌製剤  
**レボフロキサシン錠100mg「トーフ」**  
《レボフロキサシン錠》

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。  
なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要する場合がございますので、今後のご使用に際しましては、下記内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容

| 改訂後（下線部改訂）                          |                       |                                    | 改訂前                        |           |         |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|
| 3. 相互作用<br>併用注意(併用に注意すること)          |                       |                                    | 3. 相互作用<br>併用注意(併用に注意すること) |           |         |
| 薬剤名等                                | 臨床症状・措置方法             | 機序・危険因子                            | 薬剤名等                       | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| <u>QT延長を起すことが知られている薬剤</u><br>デラマニド等 | <u>QT延長を起すおそれがある。</u> | <u>併用によりQT延長作用が相加的に増加するおそれがある。</u> | (記載なし)                     |           |         |

該当項目のみ記載

### 2. 改訂理由

#### 「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

相手薬剤と整合性をとるため、「相互作用 併用注意」の項に追記致しました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No. 243（2015年10月）に掲載される予定です。

また、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）並びに弊社ホームページの「医療関係者の皆様へ」のページ（<http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff>）に掲載致します。



製造販売元  
**東和薬品株式会社**  
大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】  
学術部Dセンター  
☎0120-108-932