

ブシラミン錠「トローワ」

を服用される患者さんへ

この薬は、関節リウマチの免疫異常を正常に近づけることにより、炎症症状をやわらげます。

服用時の注意点

- 効果が得られるまでにある程度の期間(1～3ヵ月)を要する場合があります。「効果がない」、「症状が治まっている」などの理由から**自分の判断で服用を中止したり、服用量を変更したりしないでください。**
- 医師の指示に従って服用してください。
- 医師の指示に従って定期的に検査を受けてください。

服用に注意が必要な方

次のような方は必ず医師にお伝えください。

- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する方
- 血液、腎臓、肝臓に障害がある、またはあった方
- 薬を使用してかゆみや発疹などアレルギー症状がでたことがある方



裏面もお読みください。

次のような症状に気がいたら、
すぐに医師または薬剤師に相談してください。

かぜのような症状

(発熱、のどが痛い、咳、息苦しい
など)

尿の異常

(尿の色が変わる、たん白尿※)
※尿検査をしなければわかりません

皮膚の異常

(発疹、かゆみ、紅斑、水ぶくれ、
青あざ、皮下出血など)

その他の異常

(むくみ、毛がぬける、爪が黄色
くなる、体がだるい、皮膚や
白目が黄色くなる、手足に力
が入らない、めまい、目の充
血、味覚が変わる、口内炎、食
欲がない、むかむかするなど)

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、
医師または薬剤師に相談してください。

施設名

