

# オランザピン「トローワ」

を服用されている方とご家族の方へ

**この薬を服用する際は、以下の点に特に注意してください。**

- この薬は、血糖値を上昇させることがあるため、定期的に血糖値を測定する場合があります。特に、高血糖や肥満傾向の方、家族に糖尿病の方がいる方は注意してください。
- 以下のような症状があらわれた場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。



血糖値が高くなったときにあらわれる症状です

- この薬を服用中に、体重が増加することがあります。体重が増加し始めた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## その他の注意点

- この薬は、毎日飲み続けることが大切です。体調がよくなったと自分で判断して飲むのを止めたりせずに、医師の指示通りに飲んでください。
- この薬を飲み始めてからしばらくの間、立ちくらみやめまいなどが起こることがあります。これらの症状が現れた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- この薬は、人によっては眠くなることがあります。薬を飲んだ後は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。



(裏面もお読みください)

## 双極性障害におけるうつ症状を有する方へ

### ●服用中に注意する症状について

- ・うつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと感じることがあります。この薬を飲んでいる間、特に飲みはじめや飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがあるので、このような症状があらわれた場合には、医師に相談してください。
- ・不安になる、いらいらする、あせる、興奮しやすい、発作的にパニック状態になる、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、敵意を持つ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができない、などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合には、医師に相談してください。この薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。

### ●ご家族の方のサポート

- ・ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さんの行動の変化やうつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する危険性について医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。また、患者さんご自身も病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

施設名

