

本資料には、本剤に関して承認を受けた用法・用量と異なる情報が含まれています。本剤の適正使用の観点から、弊社としてはこれら承認外の用法・用量を推奨していません。また、本資料は本剤を粉砕した場合の安定性を検討した報告であり、粉砕された本剤を臨床的に使用した場合の有効性・安全性の評価は行っていません。本剤を粉砕して臨床使用する場合は、先生方の判断と責任のもとに行ってくださいようお願いいたします。

フィナステリド錠 1mg 「トーワ」の粉砕後の安定性試験

フィナステリド錠 1mg 「トーワ」は妊婦，産婦，授乳婦等への安全上の配慮から添付文書に「本剤は分割・粉砕しないこと」と記載があります。粉砕は避けて頂くようお願いいたします。

(参考) 添付文書記載事項

【使用上の注意】

2. 重要な基本的注意

(1) 本剤を妊婦に投与すると、本剤の薬理作用（DHT 低下作用）により、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがある。（「妊娠，産婦，授乳婦等への投与」の項参照）

(2) 本剤を分割・粉砕しないこと。

本剤が粉砕・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳中の女性は取扱わないこと。本剤はコーティングされているので、割れたり砕けたりしない限り、通常の手扱いにおいて有効成分に接触することはない。（「妊娠，産婦，授乳婦等への投与」の項参照）