

適正使用のお願い

2016年11月
東和薬品株式会社

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)

ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「トーフ」

ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「トーフ」

ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「トーフ」

ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「トーフ」

《ミルナシプラン塩酸塩錠》

本剤を処方される患者が自動車運転を希望する場合、以下の事項にご注意ください。

- 患者のうつ病等の精神疾患の状態が安定しているかよく観察をしてください
- 本剤の投与により、めまい、眠気に代表される自動車運転に影響を与える可能性のある副作用が発生することがあるので、患者の自覚症状の有無を確認してください
- 投与初期、他剤からの切り替え時、用量変更時（特に増量時）については、患者にとって適切な用量で精神疾患の状態が安定しているか、特に患者の状態に注意してください
- 自動車運転の可否を判断する前に一定期間、観察することもご検討ください（ただし、個人差があるので、個々の患者をよく観察してください）
- 多剤併用処方は避け、必要最小限のシンプルな処方計画を心がけてください
- 併用薬がある場合は運転の影響を予測することが困難なため、場合によっては運転を避けるよう注意することが適切な場合もあります
- 薬剤を増量した場合、過量投与となった場合、副作用発現のリスクが高くなるため、用法用量に注意してください

運転可能と判断され、患者が運転を希望する場合、処方時に以下の事項についてご指導をお願い申し上げます。

- 本剤の投与により、めまい、眠気に代表される自動車運転に影響を与える可能性のある副作用が発生する場合があること
- 投与初期、他剤からの切り替え、用量変更時等は上記副作用が発生しやすいため医師に一定期間運転を控えるよう指導された場合は運転を控え、めまい、眠気や睡眠不足等の体調不良を自覚した場合は、絶対に運転を行わないこと

本剤の使用上の注意には自動車運転等危険を伴う機械の操作に関して以下の通り記載がございます。

重要な基本的注意

眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。

また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。



製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】
学術部DIセンター
☎0120-108-932