

アリピプラゾール「トーワ」を服用されている方とご家族の方へ

この薬は、毎日飲み続けることが大切です。自分の判断で、服用量や服用する回数を増やしたり減らしたり、服用を中止したりせずに、医師の指示通りに飲んでください。

特に注意すること

この薬を服用すると、以下のような副作用があらわれることがあります。
このような症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

▶高血糖や低血糖があらわれることがあります

高血糖の症状(激しいのどの渴き、水やジュースをたくさん飲む、尿の量が多い、尿の回数が多いなど)や低血糖の症状(脱力感、倦怠感、冷や汗、手足のふるえ、うとうとする、意識が薄れるなど)があらわれたら、ただちに受診してください。



高血糖のときにあらわれる症状です

▶衝動が抑えられない状態があらわれることがあります

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を繰り返したり、性欲や食欲が病的に亢進するなど、衝動が抑えられない状態があらわれることがあります。このような症状があらわれたら、医師または薬剤師に相談してください。

- この薬を服用すると、体重が変動(増加、減少)する、じっと座っていられない、手足のふるえ、不眠などの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれたり、いつもと違うと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。
- この薬を服用する以前に、他の抗精神病薬を服用していて月経がとまっていた場合には、月経が再開することがあります。月経量が増える、貧血などの症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 眠気や注意力・集中力・反射能力などの低下が起こることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。



東和薬品株式会社

2018年1月改訂(C-2)