

アリピプラゾール内用液「トーワ」 を服用されている方へ

この薬はオレンジ風味の「のみ薬」です。
目、耳、鼻には使用しないでください。

服用方法

- 図のように「押さえる」マークを持って開封口から開けてください。

他の部分を持って開封すると
中身が飛び出ることがあります。

3mL包は形状は異なりますが、
開け方は同じです。



- ゆっくりと袋を絞るようにして、切り口から直接お飲みください。
- 開封後はすみやかに全量をお飲みください。

(裏面もお読みください。)

- 飲みづらい場合は、コップ一杯くらいの白湯、湯冷まし、ジュースなどに混せてすみやかにお飲みください。
- 水道水(煮沸していないもの)、茶葉由来飲料(紅茶、ウーロン茶、緑茶や玄米茶等)、味噌汁とは混ぜないでください。
- 硬度の高い一部のミネラルウォーターなどに混ぜると濁ることがあります。濁った場合は服用しないでください。
- 他の薬剤と混ぜると濁ることがありますので、他の薬剤と混せて服用する場合には、医師または薬剤師に相談してください。

保管上の注意

- 子どもの手の届かないところに保管してください。
- 直射日光や高温を避けて保管してください。



東和薬品株式会社

2017年2月改訂 (C-2)