エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)

エンテカビル錠「トーワ」を服用されている方へ

●この薬は通常、長期間の服用が必要です。
服用を途中で止めると病気が悪化することがありますので、必ず医師または薬剤師の指示どおり服用し自分の判断で絶対に止めないで下さい。

●服用の仕方
この薬の吸収は食事の影響を受けますので空腹時*に服用して下さい。
(*食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)

東和薬品株式会社

2023年5月改訂(DC-003361_01)