

副作用について

この薬を服用していると、下記のような副作用があらわれることがあります。

- 下痢 ●腹痛 ●口内炎 ●吐き気、嘔吐
- 食欲不振 ●体がだるい
- 皮膚や白目が黄色くなる ●味覚障害
- 皮膚や爪の色素沈着 ●発疹・痒み
- 発熱 ●立ちくらみ
- 青あざがでやすい



このほかにも気になる症状があれば、医師または薬剤師に相談してください。

副作用を早く見つけるために医師の指示に従い、定期的な診察を受けてください。


施設名

ホリナート「トーフ」を服用されている方へ

ホリナート「トーフ」はテガフル・ウラシル配合剤（ユーエフティ）と一緒に服用し[ホリナート・テガフル・ウラシル療法]、その効果を高める薬です。

この薬を服用する前に下記の内容を確認し、該当する場合には医師または薬剤師に相談してください

- 熱がある、出血傾向がある、体がだるい
- ひどい下痢がある
- 感染症にかかっている
- 以前にこの薬を使用してアレルギー症状がでたことがある
- テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（ティーエスワンなど）を服用中または7日以内に服用していた
- 妊娠中、妊娠している可能性のある方、授乳中の方




服用方法


- 1日3回、約8時間ごとに、テガフル・ウラシル配合剤(ユーエフティ)と必ず一緒に飲んでください。
- 食事の前1時間を避けてコップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。



服用の例



- 通常28日間連続で服用し、その後7日間服用を休みます。これを1クールとして繰り返します。



ご自身の判断で薬の量や服用する時間、回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。必ず、医師に指示された服用方法に従ってください。

服用時の注意

飲み忘れた場合

飲み忘れた場合は、その薬は飲まずにとばして、次の服用時に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。

一緒に飲んではいけない薬

- テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(ティーエスワンなど)と絶対一緒に飲んではいけません。(副作用が強くあらわれる恐れがあります)
- テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(ティーエスワンなど)を中止して7日以内はこの薬を飲んではいけません。

飲み合わせに注意する薬

- フェニトイン(てんかんの薬)
- ワルファリンカリウム(血液を固まりにくくする薬)
- 他の抗がん剤
- スルファメトキサゾール・トリメトプリムなど(抗菌剤)

他に薬を飲んでいる場合は服用前に医師または薬剤師に相談してください。他施設受診時にはこの薬を飲んでいることを伝えてください。