

ジェノゲスト「トーフ」を服用される方へ



治療効果について

月経痛への効果

この薬は卵巣からのエストロゲンの産生を抑制し、子宮内膜の周期的な増殖を抑えます。この薬を服用すると月経はなくなり、月経に伴うつらい痛みなどの自覚症状が抑えられます。

月経時以外の痛み*への効果


この薬は子宮内膜症の病巣に直接作用して、病巣の増殖を抑制する作用を持っているので、月経時以外の痛み*も抑えます。

*: 下腹部痛・腰痛・性交痛・排便痛など

不正性器出血について

この薬を服用中は通常の月経より子宮内膜が薄くて剥がれやすい状態になっているため、予期しないときに不正性器出血が起こりやすくなります。この不正性器出血は、少量であったり、月経時と同程度の出血量であったりと個人差があります。

出血量が多く、長引いた場合や、一度に大量の出血がおこった場合には、すぐにかかりつけの医師に相談してください。



- この薬を服用中は、かかりつけの医師の指示に従って、必ず飲み薬（経口避妊薬：ピル）以外の方法で避妊してください。
- この他にも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

ジェノゲスト「トーフ」を服用される方へ



治療効果について

月経痛への効果

この薬は卵巣からのエストロゲンの産生を抑制し、子宮内膜の周期的な増殖を抑えます。この薬を服用すると月経はなくなり、月経に伴うつらい痛みなどの自覚症状が抑えられます。

月経時以外の痛み*への効果


この薬は子宮内膜症の病巣に直接作用して、病巣の増殖を抑制する作用を持っているので、月経時以外の痛み*も抑えます。

*: 下腹部痛・腰痛・性交痛・排便痛など

不正性器出血について

この薬を服用中は通常の月経より子宮内膜が薄くて剥がれやすい状態になっているため、予期しないときに不正性器出血が起こりやすくなります。この不正性器出血は、少量であったり、月経時と同程度の出血量であったりと個人差があります。

出血量が多く、長引いた場合や、一度に大量の出血がおこった場合には、すぐにかかりつけの医師に相談してください。



- この薬を服用中は、かかりつけの医師の指示に従って、必ず飲み薬（経口避妊薬：ピル）以外の方法で避妊してください。
- この他にも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。