

モンテルカスト細粒「トーワ」

上手な飲ませ方

- このくすりは気道の炎症を抑え、ぜんそく症状を改善し、ぜんそく発作を予防するくすりです。
(すでに起こっているぜんそく発作を止めるくすりではありません。)
- 継続して飲むことが大切なので、症状がなくなっても自分の判断でやめないでください。
- 1日1回1包をねる前に飲ませてください。
- このくすりは光に不安定なため、飲ませるまでは開封しないでください。開封後はすぐに(15分以内に)1包全部を残さず飲ませてください。

飲ませ方

このくすりには甘みがついていますので、そのままでも飲みやすくなっています。
直接口に入れるか、スプーンなどにとって飲ませてください。
口の中にくすりが残ったときは、水などの飲み物を飲ませてください。



(裏面もお読みください)

モンテルカスト細粒「トーワ」

上手な飲ませ方

- このくすりは気道の炎症を抑え、ぜんそく症状を改善し、ぜんそく発作を予防するくすりです。
(すでに起こっているぜんそく発作を止めるくすりではありません。)
- 継続して飲むことが大切なので、症状がなくなっても自分の判断でやめないでください。
- 1日1回1包をねる前に飲ませてください。
- このくすりは光に不安定なため、飲ませるまでは開封しないでください。開封後はすぐに(15分以内に)1包全部を残さず飲ませてください。

飲ませ方

このくすりには甘みがついていますので、そのままでも飲みやすくなっています。
直接口に入れるか、スプーンなどにとって飲ませてください。
口の中にくすりが残ったときは、水などの飲み物を飲ませてください。



(裏面もお読みください)

モンテルカスト細粒「トーワ」

上手な飲ませ方

- このくすりは気道の炎症を抑え、ぜんそく症状を改善し、ぜんそく発作を予防するくすりです。
(すでに起こっているぜんそく発作を止めるくすりではありません。)
- 継続して飲むことが大切なので、症状がなくなっても自分の判断でやめないでください。
- 1日1回1包をねる前に飲ませてください。
- このくすりは光に不安定なため、飲ませるまでは開封しないでください。開封後はすぐに(15分以内に)1包全部を残さず飲ませてください。

飲ませ方

このくすりには甘みがついていますので、そのままでも飲みやすくなっています。
直接口に入れるか、スプーンなどにとって飲ませてください。
口の中にくすりが残ったときは、水などの飲み物を飲ませてください。



(裏面もお読みください)

モンテルカスト細粒「トーワ」

上手な飲ませ方

- このくすりは気道の炎症を抑え、ぜんそく症状を改善し、ぜんそく発作を予防するくすりです。
(すでに起こっているぜんそく発作を止めるくすりではありません。)
- 継続して飲むことが大切なので、症状がなくなっても自分の判断でやめないでください。
- 1日1回1包をねる前に飲ませてください。
- このくすりは光に不安定なため、飲ませるまでは開封しないでください。開封後はすぐに(15分以内に)1包全部を残さず飲ませてください。

飲ませ方

このくすりには甘みがついていますので、そのままでも飲みやすくなっています。
直接口に入れるか、スプーンなどにとって飲ませてください。
口の中にくすりが残ったときは、水などの飲み物を飲ませてください。



(裏面もお読みください)

そのままで飲みにくい場合は・・・

次のような柔らかい食物、調整ミルクや母乳と混ぜて飲ませることもできます。

- ★ヨーグルト
- ★ゼリー
- ★バニラアイスクリーム
- ★ベビーフード(りんご・にんじんなど)



スプーン1杯の食物を
おわんにいれてください



くすりを入れて
軽く混ぜてください



全量を飲ませて
ください

- 飲食物と混ぜて飲ませる時は、飲ませる直前に混ぜてください。
- 温かいものとは混ぜないで、室温(30°C)以下に冷ましてから混ぜてください。

施設名

飲ませ方の情報



<http://twyh.jp/mon-fg/>

 東和薬品株式会社

2017年2月作成(C-1)

そのまま飲みにくい場合は・・・

次のような柔らかい食物、調整ミルクや母乳と混ぜて飲ませることもできます。

- ★ヨーグルト
- ★ゼリー
- ★バニラアイスクリーム
- ★ベビーフード(りんご・にんじんなど)



スプーン1杯の食物を
おわんにいれてください



くすりを入れて
軽く混ぜてください



全量を飲ませて
ください

- 飲食物と混ぜて飲ませる時は、飲ませる直前に混ぜてください。
- 温かいものとは混ぜないで、室温(30°C)以下に冷ましてから混ぜてください。

施設名

飲ませ方の情報



<http://twyh.jp/mon-fg/>

 東和薬品株式会社

2017年2月作成(C-1)

そのまま飲みにくい場合は・・・

次のような柔らかい食物、調整ミルクや母乳と混ぜて飲ませることもできます。

- ★ヨーグルト
- ★ゼリー
- ★バニラアイスクリーム
- ★ベビーフード(りんご・にんじんなど)



スプーン1杯の食物を
おわんにいれてください



くすりを入れて
軽く混ぜてください



全量を飲ませて
ください

- 飲食物と混ぜて飲ませる時は、飲ませる直前に混ぜてください。
- 温かいものとは混ぜないで、室温(30°C)以下に冷ましてから混ぜてください。

施設名

飲ませ方の情報



<http://twyh.jp/mon-fg/>

 東和薬品株式会社

2017年2月作成(C-1)

そのまま飲みにくい場合は・・・

次のような柔らかい食物、調整ミルクや母乳と混ぜて飲ませることもできます。

- ★ヨーグルト
- ★ゼリー
- ★バニラアイスクリーム
- ★ベビーフード(りんご・にんじんなど)



スプーン1杯の食物を
おわんにいれてください



くすりを入れて
軽く混ぜてください



全量を飲ませて
ください

- 飲食物と混ぜて飲ませる時は、飲ませる直前に混ぜてください。
- 温かいものとは混ぜないで、室温(30°C)以下に冷ましてから混ぜてください。

施設名

飲ませ方の情報



<http://twyh.jp/mon-fg/>

 東和薬品株式会社

2017年2月作成(C-1)