



シルデナフィル OD錠 50mgVI「トローワ」

患者用指導せん変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、シルデナフィル OD錠 50mgVI「トローワ」の患者用指導せんを下記のとおり変更致しますのでご案内申し上げます。

記

【変更包装単位および変更ロット(使用期限)】

コーヒー風味 (PTP20錠) : Lot No. B012 (2019/10)

コーヒー風味 (PTP60錠) : Lot No. B012 (2019/10)

レモン風味 (PTP20錠) : Lot No. B023 (2019/8)

レモン風味 (PTP60錠) : Lot No. B025 (2019/10)

【変更内容】

併用禁忌、その他注意の追記

	オモテ	ウラ
変更前	<p>シルデナフィルOD錠50mgVI「トローワ」を服用される方へ</p> <p>このお薬を安全に使用するため飲む前に必ずお読みください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●狭心症などの心臓病によく用いられるニトログリセリンなどの硝酸薬と本剤は併用できません。^{S-2} 重篤な副作用(死亡を含む)を起こすことがあります。 ●医師の処方に従って飲んでください。決して自分で量を増やしてはいけません。必ず1日1回までの服用としてください。次に飲むときは24時間以上あけて飲んでください。裏面もご覧ください。 	<p>シルデナフィルOD錠50mgVI「トローワ」を服用される方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この薬はあなたに処方されたものです。決して他人に譲り渡したりしないでください。 ●医師の指示により25mgを服用する場合は、1錠(50mg錠)を半分に分けて服用してください。 ●この他の注意事項について聞きたい場合や、わからないことがある場合には、医師または薬剤師に相談してください。
変更後	<p>シルデナフィルOD錠50mgVI「トローワ」を服用される方へ</p> <p>この薬を安全に使用するため飲む前に必ずお読みください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●狭心症などの心臓の疾患に使われるニトログリセリンなどの硝酸薬(類薬を含む)や不整脈に使われるアミオダロン、肺高血圧症に使われるリオシグアトは併用できません。^{S-3} 重篤な副作用を起こすことがあります。 ●医師の処方に従って飲んでください。決して自分で量を増やしてはいけません。必ず1日1回までの服用としてください。次に飲むときは24時間以上あけて飲んでください。裏面もご覧ください。 	<p>シルデナフィルOD錠50mgVI「トローワ」を服用される方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この薬の服用後に視力が低下することがあります。眼の異常に気付かれた場合は服用を中止し、すぐに医師または眼科医を受診してください。 ●この薬はあなたに処方されたものです。決して他人に譲り渡したりしないでください。 ●医師の指示により25mgを服用する場合は、1錠(50mg錠)を半分に分けて服用してください。 ●この他の注意事項について聞きたい場合や、わからないことがある場合には、医師または薬剤師に相談してください。 <p>2016年11月改訂(S-3)</p>

以上