


ソロブテロールテープ「トーワ」の貼り方

- ①このテープは、胸、背中、上腕のいずれか1力所に貼って使用します。貼る場所を乾いたタオル等でよく拭いて、きれいにします。切り口表示に従って、2力所を両方とも切って、テープを取り出します。




0.5mg、1mg、2mg のテープがありますが、使い方はいずれも同じです。


- ②緑色の文字が表示されているフィルム面を上にします。




- ③テープを山折りにし、両方のフィルム面を半分ほど浮かしてから、片方のフィルム面をはがします。この時、テープを左右に強く引っ張らないようにして下さい。テープの接着面に指がふれないように注意して下さい。



- ④残りのフィルム面を持ってテープを胸、背中、上腕のいずれか1力所に貼り、軽く押さえます。残りのフィルム面をひっくり返し、フィルム面をずらしながら残りのテープを貼っていきます。




- ⑤貼ったあと、手のひらでしっかりとまんべんなく押さえます。



貼る時の注意

- このテープは、今のあなたの症状に合わせて出された薬です。
医師または薬剤師の指示に従って正しくお使い下さい。
(このテープを家族や他の人にあげてはいけません。)
- テープは1日1回、必ず貼りかえて下さい。
- 貼る場所



■で示した胸、背中
上腕のいずれか1カ所に
貼って下さい。

- テープをフィルム面からはがす時に左右に強くひっぱると、破れることがあります。
- 接着面に指がついてしまうと粘着力が低下してうまく貼れないことがあります。
- テープは1度はがしたら、再び貼り直すことができません。
- 傷口や湿疹のあるところには貼らないで下さい。
- 汗をかきやすいところや、クリーム、軟膏等をぬった部分には貼らないで下さい。
- テープをはがしてしまった可能性のある子供には、手の届かないところに貼って下さい。
- テープが少しはがれた場合は、刺激の少ない絆創膏等で固定して下さい。
- 同じところに続けて貼ると、かゆくなったり、かぶれたりすることがありますので、新しいテープに貼りかえる時は、同じところを避けて貼って下さい。
- テープを使って、何か変だと感じたことがあった時は、医師または薬剤師に相談して下さい。

保管上の注意

- 使用するまでは、袋を開けずに高温を避けて保管して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。