



ジドレンテープ 27mg 患者用指導せん変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ジドレンテープ 27mg の患者用指導せんを下記のとおり変更致しますのでご案内申し上げます。

記

【変更包装単位および変更ロット(使用期限)】

140 枚 : Lot No. A159 (2019/5)

【変更内容】

薬の説明 (狭心症の薬)、併用禁忌の追記

変更前	<p>オモテ</p> <p style="text-align: center;">患者さんへ</p> <p>ジドレンテープ27mg (DYDRENE TAPE 27mg) の使い方</p> <p>貼る場所 医師又は薬剤師の指示に従って胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください。 貼る場所が汗・脂等でぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。</p> <p style="text-align: center;">■ 薬を貼る場所</p> <p>必ず上の図のいずれかの場所に貼ってください</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自動体外式除細動器 (AED) の電極パッドの貼付部位は「右鎖骨すぐ下」と「左脇下の肋骨最下部」です。 本剤を貼る際は、AEDの妨げとならないよう、必ず上の図の場所に貼ってください。 <p style="text-align: center;">裏面もお読みください</p>	<p>ウラ</p> <p>貼り方</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 四角の透明シールにスリットを入れてありますので、それを上にして二つに折ってください。 ② シールの一方をはがして、テープの粘着面を皮膚に貼り付けてください。 ③ もう一方のシールも同様にはがし、皮膚に貼ってください。(テープにしわが寄らないように十分注意して貼ってください。) <p>その他の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所及び胸毛の部分には貼らないで下さい。 ● 新しい薬に貼り替えるときは、前回と異なる場所に貼ってください。 ● 薬を貼っているときには勃起不全治療剤 (バイアグラ錠、レバチオ錠、レビトラ錠、シアリス錠) や、アドシルカ錠などは絶対に服用しないでください。 ● 小児の手の届かないところに保管してください。 ● ご使用になるまでは、開封しないで、高温を避けて保管してください。 <p style="text-align: center;">2012年2月改訂 (C-4)</p>
	変更後	<p>オモテ</p> <p style="text-align: center;">患者さんへ</p> <p>ジドレンテープ27mg (DYDRENE TAPE 27mg) の使い方</p> <p>このテープは狭心症の薬です。医師の指示に従って、正しく使用してください。</p> <p>貼る場所 胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください。 貼る場所が汗・脂等でぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。</p> <p style="text-align: center;">■ 薬を貼る場所</p> <p>必ず上の図のいずれかの場所に貼ってください</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自動体外式除細動器 (AED) の電極パッドの貼付部位は「右鎖骨すぐ下」と「左脇下の肋骨最下部」です。 本剤を貼る際は、AEDの妨げとならないよう、必ず上の図の場所に貼ってください。 <p style="text-align: center;">裏面もお読みください</p>

以上