

# アムロジピンOD錠「トーフ」

を服用される方へ



2.5mg



5mg



10mg

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です

普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。

## 水なしで飲む場合

舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。水で飲んだ場合と効き目は変わりません。

※水なしで飲む場合は、寝たまま飲まないでください。

(薬が食道に引っかかり炎症を起こすおそれがあります。)

## ○飲み忘れた場合

高血圧症の場合はその日は飲まなくても構いません。次の日から指示どおりに飲んでください。

狭心症の場合は気がついた時点ですぐに1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合(8時間以内程度)は1回とばして、次回から指示された時間に飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

裏面もお読みください。

**この薬は以下のように保管してください**

- 湿気を避けて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- 誤って飲んでしまわないよう、こどもの手の届かないところに保管してください。

**この薬を飲んでいる間は次の点にご注意ください**

- 血圧低下により、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う機械を操作する際は十分注意してください。
- グレープフルーツジュースは、本剤の降圧作用を強めるおそれがありますので、同時に服用しないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

施設名

