

# ファムシクロビル「トローワ」

を服用される方へ

この薬はウイルスの増殖を抑える作用があります。効果があらわれるまでに少し日数がかかることがあります。ご自身の判断で飲む量を加減したり、中止したりしないで、**医師の指示通りに服用してください。**



## 服用前の注意

以下に該当する場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 腎臓が悪いと言われたことがある
- 透析を受けている

## 服用中の注意

服用中は普段より多めに水分をとってください。



腎臓から薬が排泄されやすくなります。

※水分の摂取を制限されている方は、医師の指示に従ってください。

裏面もお読みください

服用中に下記のような症状があらわれた場合は、  
すぐに受診してください。

- 考えがまとまらない、判断や考えがおかしくなる
- 幻覚・幻聴（ないものが見えたり、誰もいないのに話し声や物音が聞こえたりする）
- 意識がなくなる
- 高熱を伴い、目の充血や口のただれが出てきた
- （患部とは別に）広範囲に発疹（ぶつぶつや斑点）が出てきた
- 薬を飲む前に比べて尿量が減った、または尿がほとんど出ない
- むくみが出た
- 赤褐色の尿が出た
- 手足・肩・腰などの筋肉痛
- 脱力感（手足に力が入らない）

自動車の運転等、危険を伴う機械の操作を行う場合には十分に注意しましょう。

意識障害（気を失う、もうろう状態）等があらわれることがあります。

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、  
医師または薬剤師に相談してください。

