

ロピニロール徐放錠「トーフ」 を服用される方とご家族の方へ

この薬を正しく服用するため、飲む前に必ずお読みください。

- この薬を飲むと、眠くなったり、前兆もなく急に眠り込んでしまうこと(突発的睡眠)があります。



**自動車の運転、危険を伴う機械の操作、
高い所での作業などは避けてください。**

突発的睡眠について

食事中や会話の最中などに急に眠り込んでしまうことがあります。また、このような症状は、薬を飲み始めて1年以上経過してからみられる場合もあります。

- しょうどうせいぎょしょうがい衝動制御障害や、以下のようなことが起こったら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

- ・急激な眠り込み
- ・発熱や意識がぼんやりした状態
- ・幻覚や妄想
- ・筋肉のこわばりがひどい状態
- ・めまいや立ちくらみ(ふらつき)

衝動制御障害(病的賭博、強迫性購買、病的性欲亢進、暴食等)

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を繰り返したり、病的に性欲や食欲が亢進したりすること。

- この薬はゆっくり溶け出し、長時間作用するように設計されているので、割ったり砕いたりしないで、そのまま噛まずに飲んでください。
- 飲み方は、必ず医師の指示に従ってください。
自分の判断で飲む量を変えたり、飲むのを止めたりしないでください。
また、できるだけ毎日同じ時間帯にお飲みください。
- この他にも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。



東和薬品株式会社

2017年8月作成(C-1)