

# メトトレキサート「トローワ」 を服用されている方へ

## この薬の飲み方

- この薬は、1週間のうち、**決められた日**にだけ飲んでください。
- この薬は、1週間のうち、**薬を飲まない期間**を必要とします。

### 【飲み方の例】

- 1週間に1回で飲む場合

飲み始めの日(1日目)		2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
朝	夜	朝	夜					
<b>飲む</b>	<b>休薬期間(薬を飲まない期間)</b>							

- 1週間に2回に分けて飲む場合

飲み始めの日(1日目)		2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
朝	夜	朝	夜					
<b>飲む</b>	<b>飲む</b>	<b>休薬期間(薬を飲まない期間)</b>						

- 1週間に3回に分けて飲む場合

飲み始めの日(1日目)		2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
朝	夜	朝	夜					
<b>飲む</b>	<b>飲む</b>	<b>飲む</b>	<b>休薬期間(薬を飲まない期間)</b>					

- この薬の飲み忘れに気づいた場合には、その薬は飲まずにとばしてください。2回分を一度に飲まないでください。
- コップ1杯あるいはそれ以上の多めの水またはぬるま湯で飲んでください。
- 他の薬を飲んでいる場合、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。



このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、  
医師または薬剤師に相談してください。

(裏面もお読みください)

## 服用中に気をつけていただくこと（副作用）

- この薬を飲んでいるあいだに、重篤な副作用があらわれることがあります。次の症状が認められた場合には、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

発熱、のどの痛み、  
かぜのような症状



せき（からせき）、  
息切れ、息苦しさ



口内炎



（ひどく）疲れやすい、  
からだがだるい



その他

嘔吐（おうと）、  
尿の量・回数が急に減った、  
からだがむくんだ

このほかにも気になる症状がでた場合は、  
医師または薬剤師に相談してください。

## 生活上の注意

- 妊娠している患者さん、授乳中の患者さんはこの薬を飲むことはできません。
- 本人あるいはパートナーの方がこの薬を飲んでいるあいだおよび飲むのを中止してから一定期間（期間については医師または薬剤師に確認してください）は、妊娠しないように注意してください。  
妊娠がわかった場合には、すぐに医師に相談してください。
- この薬を飲んでいるあいだは生ワクチン〔麻疹（はしか）、風疹（ふうしん）、おたふくかぜ、水痘（みずぼうそう）、BCG、ポリオ（小児まひ）など〕の接種はできません。  
接種の必要がある場合には医師に相談してください。

他の医療機関にかかる時には、医師またや薬剤師にこの薬を  
飲んでいることを必ず申し出てください。

