

トワのスタチン製剤

を服用されている方へ

この薬について

この薬は、脂質異常症(高脂血症)の治療薬です。
肝臓でのコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させます。

この薬を飲むときは、以下の点にご注意ください

おうもんきんゆうかいしょう

1. 筋肉の副作用として、ごくまれに横紋筋融解症を起こすことがあります。
- 飲み始めてから、**筋肉が痛い、手足の力が入らない、尿の色が濃い(赤褐色になる)等の症状**に気づかれた場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉障害により、手足や全身の筋肉痛、しびれや脱力(感)などの症状があらわれ、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。また、尿の色が濃く、赤褐色の尿がみられることがあります。

これらの症状を放置していると、尿がでにくくなるなど腎臓の機能が低下することがあります。

- 副作用はどんな薬にもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。
- 薬を服用して他にも体調がおかしいと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。
- 他の病院や医院にかかるときはこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

裏面もお読みください。

2. 医師に指示された用法・用量を守ってください。

- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

その他の注意点

- 光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 誤って飲んでしまわないよう、こどもの手の届かないところに保管してください。

対象製品一覧

- アトルバスタチン錠「トーワ」
- アトルバスタチンOD錠「トーワ」
- シンバスタチン錠「トーワ」
- ピタバスタチンCa錠「トーワ」
- ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」
- プラバスタチンNa錠「トーワ」
- ロスバスタチン錠「トーワ」
- ロスバスタチンOD錠「トーワ」

施設名