

# タクロリムス「トローワ」を 服用される方へ

この薬を服用する前に、下記の内容を確認し、  
該当される方は医師または薬剤師に  
相談してください。

- 熱・咳・息苦しさがある
- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー一  
症状が出たことがある
- 妊娠または妊娠している可能性がある
- 授乳中である
- ほかの薬(市販の薬を含む)や健康食品、  
サプリメントなどを服用している
- 予防接種を受ける予定がある
- 肝臓が悪い
- 腎臓が悪い

裏面には薬を服用する際の  
注意点が記載されていますので、  
必ず確認してください。



東和薬品株式会社



## 薬を服用する際には下記の点にご注意ください

- PTPシートから薬を取り出して、服用してください。
- 必ず指示された時間に、指示された量を、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- <1日2回飲む場合>  
飲み忘れた場合は、気がついた時できるだけ早く1回分を服用してください。  
ただし、次に飲む時間は5時間以上あけてください。  
絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。
- <1日1回飲む場合>  
飲み忘れた場合は、翌日の夕食後に1回分を服用するようにしてください。  
絶対に2回分を一度に飲んだり、服用時間を変更しないようにしてください。
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- ご自分の判断で薬の量や服用する時間、回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。



## 服用期間中は下記の点にご注意ください

- 予防接種は医師の許可なしに受けないで、必ず相談してください。
- グレープフルーツ(ジュースを含む)や一部のかんきつ類(ブンタン、ハッサクなど)は、この薬の作用を強くし、副作用があらわれやすくなる場合がありますので、一緒に摂取することは避けてください。
- セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む健康食品・サプリメントは、この薬の作用を弱くすることがありますので、一緒に摂取することは避けてください。



気になることやわからないことがある場合や、  
服用中に体調の変化などがありましたら、  
医師または薬剤師に相談してください。