

タクロリムス「トローワ」を 服用される潰瘍性大腸炎の方へ

この薬を服用する前に、下記の内容を確認し、
該当される方は医師または薬剤師に
相談してください。

- 熱・腹痛・下痢・全身けん怠感がある
- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー一
症状が出たことがある
- 妊娠または妊娠している可能性がある
- 授乳中である
- ほかの薬（市販の薬を含む）や健康食品、
サプリメントなどを服用している
- 予防接種を受ける予定がある
- 肝臓が悪い
- 腎臓が悪い

裏面には薬を服用する際の
注意点が記載されていますので、
必ず確認してください。



東和薬品株式会社



薬を服用する際には下記の点にご注意ください

- PTPシートから薬を取り出して、服用してください。
- 必ず指示された量を、朝食後と夕食後の1日2回、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に飲む時間は5時間以上あけてください。**絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。**
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- ご自分の判断で薬の量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。



服用期間中は下記の点にご注意ください

- 熱・腹痛・下痢・全身けん怠感がみられた場合は、医師・薬剤師に相談してください。
- 妊娠を予定または妊娠している可能性が分かった場合には、直ちに医師・薬剤師に相談してください。
- 予防接種は医師の許可なしに受けなくて、必ず相談してください。
- グレープフルーツ(ジュースを含む)や一部のかんきつ類(ブンタン、ハッサクなど)は、この薬の作用を強くし、副作用があらわれやすくなることがありますので、一緒に摂取することは避けてください。
- セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む健康食品・サプリメントは、この薬の作用を弱くすることがありますので、一緒に摂取することは避けてください。



**気になることやわからないことがある場合や、
服用中に体調の変化などがありましたら、
医師または薬剤師に相談してください。**

施設名・連絡先