

炭酸ランタン顆粒分包「トローワ」 を服用されている方へ

この薬は、高リン血症を治療するための薬です。

この薬を飲むときは、以下の点にご注意ください

食事後すぐに、
少量の水またはぬるま湯で
服用してください。



- この薬は、食事に含まれるリンとおなかの中で結合して、便と一緒にリンを体の外に出します。
- この薬による吐き気や嘔吐は、食事後すぐに服用すると減ることが知られています。

- ✓ 吐き気や嘔吐によって、飲むことが難しく感じられた時には、自分の判断で飲むのを止めず、医師または薬剤師に相談してください。
- ✓ 腹部レントゲン検査や胸部レントゲン検査を受診される場合、この薬の影が映ることがあります。この薬を飲んでいることを医師または医療スタッフにお伝えください。

(裏面もお読みください)

高リン血症とは

体内にリンがたまってしまい、血液中のリンの値が高くなる病気です。高リン血症が続くと、次のような合併症の引き起こされる可能性が高まります。

高リン血症

二次性副甲状腺機能亢進症

(にじせいふくこうじょうせんきのうこうしんしょう)




血液中のリンの値が高くなると、副甲状腺ホルモンというホルモンが過剰に分泌されます。このホルモンは、骨からカルシウムを溶かし出すため、骨がもろくなり、骨の病気を引き起こします。

異所性石灰化

(いしょせいせっかいが)

血管が詰まりやすい



P リン Ca カルシウム

体内にたまったリンがカルシウムと結合して、骨以外の組織に沈着してしまふことがあります。血管に沈着すると、血管が骨のように硬くなり、心筋梗塞や脳梗塞を発症しやすくなります。

高リン血症を治療し、合併症のリスクを減らすために、毎日の食事に気をつけ、この薬を忘れずに服用して、体内のリンをコントロールすることが大切です。



東和薬品株式会社