

ナルフラフィン塩酸塩カプセル「トワ」 を服用されている方へ

透析または肝疾患治療を受けている方の
かゆみを改善する薬です。

下記のような症状に気づいたら、
医師または薬剤師に相談してください。

● なかなか寝付けない



● 便秘になる



● おしっこが近くなる



● 眠気がする、めまいがする



※おしっこが近くなる症状は、肝疾患治療を受けている方に気を付けてほしい症状です。

▶ 飲み始めてから、血液透析を受けている方は2週間、肝疾患治療を受けている方は4週間、特に気をつけてください。

また、この薬を長い間飲まれている方でも体調の変化によって、このような症状があらわれることがあります。

▶ 眠気やめまいなどが起こることがありますので、自動車の運転や危険を伴う機械を扱わないようにしてください。

お薬の飲み方

- 1日1回、夕食後または就寝前の決められた時間に服用してください。
- 服用する直前にシートから取り出して飲んでください。
- グレープフルーツジュース※は一緒に摂らないようにしてください。

※作用が強くなりすぎたり、副作用が現れやすくなるおそれがあります。

飲み忘れた場合

夕食後の服用を指示されている場合、飲み忘れに気が付いたのがその日の就寝前ならば、1回分を飲んでください。

それ以外の場合は、飲み忘れた分は1回とばして、次の通常飲む時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

次のような方は、ご使用前に必ず医師または薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある
- 妊娠または授乳中
- 現在服用している薬がある※

※一緒に飲むと作用が強く出たり、弱くなったりする可能性もありますので、薬局で買った薬も含めて伝えてください。

保管方法

- 高温多湿の場所や光が直接当たる場所での保管は避けてください。

東和薬品株式会社