

ミドロン酸錠50mg「トーワ」

を服用されている方へ

この薬は4週に1回1錠飲む薬です。
(毎日、毎週飲む薬ではありません。)

4週に1回、決められた日に1錠を下記の手順で飲んでください。

朝、起きたとき(食事前)
に、1錠をコップ1杯
(約180mL)の水^注
で飲んでください。
(注)水道水や市販の水(Ca、Mg等の
含量の特に高いミネラルウォーター
を除く)で飲んでください。

飲んでから30分間は
横にならず、水以外の
飲食、他の薬の服用は
させてください。

30
分後



この薬をかんだり、
口の中で溶かしたりしないでください。

薬を飲み忘れたとき

その日は飲まないで次の朝に1錠飲んでください。
(何も飲食物をとっておらず、他の薬も飲んでいない場合は、気がついたときにすぐに1錠飲んでください。)
その後はあらかじめ決められた日に飲んでください。
決して2回分を一度に飲まないでください。

裏面もお読みください。

ミドロン酸錠50mg「トーワ」

を服用されている方へ

この薬は4週に1回1錠飲む薬です。
(毎日、毎週飲む薬ではありません。)

4週に1回、決められた日に1錠を下記の手順で飲んでください。

朝、起きたとき(食事前)
に、1錠をコップ1杯
(約180mL)の水^注
で飲んでください。
(注)水道水や市販の水(Ca、Mg等の
含量の特に高いミネラルウォーター
を除く)で飲んでください。

飲んでから30分間は
横にならず、水以外の
飲食、他の薬の服用は
させてください。

30
分後



この薬をかんだり、
口の中で溶かしたりしないでください。

薬を飲み忘れたとき

その日は飲まないで次の朝に1錠飲んでください。
(何も飲食物をとっておらず、他の薬も飲んでいない場合は、気がついたときにすぐに1錠飲んでください。)
その後はあらかじめ決められた日に飲んでください。
決して2回分を一度に飲まないでください。

裏面もお読みください。

ミドロン酸錠50mg「トーワ」

を服用されている方へ

この薬は4週に1回1錠飲む薬です。
(毎日、毎週飲む薬ではありません。)

4週に1回、決められた日に1錠を下記の手順で飲んでください。

朝、起きたとき(食事前)
に、1錠をコップ1杯
(約180mL)の水^注
で飲んでください。
(注)水道水や市販の水(Ca、Mg等の
含量の特に高いミネラルウォーター
を除く)で飲んでください。

飲んでから30分間は
横にならず、水以外の
飲食、他の薬の服用は
させてください。

30
分後



この薬をかんだり、
口の中で溶かしたりしないでください。

薬を飲み忘れたとき

その日は飲まないで次の朝に1錠飲んでください。
(何も飲食物をとっておらず、他の薬も飲んでいない場合は、気がついたときにすぐに1錠飲んでください。)
その後はあらかじめ決められた日に飲んでください。
決して2回分を一度に飲まないでください。

裏面もお読みください。

ミドロン酸錠50mg「トーワ」

を服用されている方へ

この薬は4週に1回1錠飲む薬です。
(毎日、毎週飲む薬ではありません。)

4週に1回、決められた日に1錠を下記の手順で飲んでください。

朝、起きたとき(食事前)
に、1錠をコップ1杯
(約180mL)の水^注
で飲んでください。
(注)水道水や市販の水(Ca、Mg等の
含量の特に高いミネラルウォーター
を除く)で飲んでください。

飲んでから30分間は
横にならず、水以外の
飲食、他の薬の服用は
させてください。

30
分後



この薬をかんだり、
口の中で溶かしたりしないでください。

薬を飲み忘れたとき

その日は飲まないで次の朝に1錠飲んでください。
(何も飲食物をとっておらず、他の薬も飲んでいない場合は、気がついたときにすぐに1錠飲んでください。)
その後はあらかじめ決められた日に飲んでください。
決して2回分を一度に飲まないでください。

裏面もお読みください。

この薬の服用により、以下のような症状があらわれることがあります。

- ・飲み始めてから3日以内のかぜに似た症状(発熱、吐き気、関節痛など)
- ・食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じるなど
- ・あごの痛みやしびれ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつきなど
- ・外耳炎、耳だれ、耳の痛みが続くなど
- ・太ももや太ももの付け根の痛み
- ・体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなるなど

このような症状があらわれたり、異常を感じた場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

歯科治療を受けられる方は、必ず歯科医、口腔外科医にこの薬を服用していることをお申し出ください。

ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ち、定期的に歯科検査を受けてください。

スマートフォン用
薬の情報



[http://twyh.jp/
min-t50/](http://twyh.jp/min-t50/)

東和薬品株式会社

2024年4月改訂(C-3)
DC-004560_01

この薬の服用により、以下のような症状があらわれることがあります。

- ・飲み始めてから3日以内のかぜに似た症状(発熱、吐き気、関節痛など)
- ・食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じるなど
- ・あごの痛みやしびれ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつきなど
- ・外耳炎、耳だれ、耳の痛みが続くなど
- ・太ももや太ももの付け根の痛み
- ・体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなるなど

このような症状があらわれたり、異常を感じた場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

歯科治療を受けられる方は、必ず歯科医、口腔外科医にこの薬を服用していることをお申し出ください。

ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ち、定期的に歯科検査を受けてください。

スマートフォン用
薬の情報



[http://twyh.jp/
min-t50/](http://twyh.jp/min-t50/)

東和薬品株式会社

2024年4月改訂(C-3)
DC-004560_01

ミノドロン酸錠50mg「トーワ」

この薬の服用により、以下のような症状があらわれることがあります。

- ・飲み始めてから3日以内のかぜに似た症状(発熱、吐き気、関節痛など)
- ・食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じるなど
- ・あごの痛みやしびれ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつきなど
- ・外耳炎、耳だれ、耳の痛みが続くなど
- ・太ももや太ももの付け根の痛み
- ・体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなるなど

このような症状があらわれたり、異常を感じた場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

歯科治療を受けられる方は、必ず歯科医、口腔外科医にこの薬を服用していることをお申し出ください。

ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ち、定期的に歯科検査を受けてください。

スマートフォン用
薬の情報



[http://twyh.jp/
min-t50/](http://twyh.jp/min-t50/)

東和薬品株式会社

2024年4月改訂(C-3)
DC-004560_01

この薬の服用により、以下のような症状があらわれることがあります。

- ・飲み始めてから3日以内のかぜに似た症状(発熱、吐き気、関節痛など)
- ・食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じるなど
- ・あごの痛みやしびれ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつきなど
- ・外耳炎、耳だれ、耳の痛みが続くなど
- ・太ももや太ももの付け根の痛み
- ・体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなるなど

このような症状があらわれたり、異常を感じた場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

歯科治療を受けられる方は、必ず歯科医、口腔外科医にこの薬を服用していることをお申し出ください。

ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ち、定期的に歯科検査を受けてください。

スマートフォン用
薬の情報



[http://twyh.jp/
min-t50/](http://twyh.jp/min-t50/)

東和薬品株式会社

2024年4月改訂(C-3)
DC-004560_01