

ミグリトール「トーフ」を服用される方へ

食後の過血糖(食後の急激な血糖の上昇)を改善する糖尿病の薬が処方されています。
服用される前に、以下の注意をよくお読みください。

この薬は**食事の直前**にお飲みください。

- もし食事前に飲み忘れたときには食事中または食直後に気付いた時にすぐにお飲みください。

低血糖を起こすことがあります。

- 他の糖尿病の薬(血糖を下げる薬)と併用した場合、あるいは場合によっては、併用しなくても**低血糖**を起こすことがあります。
- この薬は砂糖の消化や吸収を遅らせますので、低血糖が起こったら**必ずブドウ糖**をとってください。ブドウ糖の含まれない砂糖やアメ玉は、この薬をお飲みの時は不適切です。
- 高所作業や自動車の運転等危険を伴う機械を操作している時に、低血糖を起こすと事故につながります。特に注意してください。

消化器症状など気になる症状がある場合は
医師または薬剤師に相談してください。

- おなかが張る、おならの回数が増える、おなかが緩くなるなどの消化器症状があらわれることがあります。特に飲み始めの頃に多くみられる症状ですが、これらは時間の経過とともに改善されることが多いです。症状が気になる場合は医師または薬剤師に相談してください。

ミグリトールOD錠「トーフ」の保管について

湿気の多い場所に保管すると、やわらかくなる場合があります。
湿気を避けて保管してください。

(裏面もお読みください)

低血糖について

低血糖は危険な状態ですので、以下の点に注意してください。
この注意は必ず家族やまわりの方にも知らせておいてください。

低血糖の症状

- 空腹時の運動後、就寝前などに起こりやすく、主に次のような症状があらわれます。

異常な空腹感



力のぬけた感じ、
ぼんやり感



頭痛



手足のふるえ



目のちらつき、
ふらつき



動悸・冷や汗



(その他の症状)

呼吸がはやくなる、眠気、あくび、顔面蒼白、重篤な場合は、けいれん、意識を失う など

低血糖が起こったら

- 軽い低血糖はブドウ糖をとると治ります。低血糖が起こったらその場ですぐに**10gのブドウ糖**をとってください。
- 低血糖を起こした場合は、必ず早めに医師または薬剤師に連絡してください。

低血糖を起こさないために

- 食事、運動、飲酒、薬の飲み方について医師または薬剤師の指導を守ってください。
- 食事時刻の遅れ、激しい運動、空腹時の運動は避けるようにしましょう。



東和薬品株式会社