

使用上の注意改訂のお知らせ

2018年8月

東和薬品株式会社

持続性ACE阻害剤

日本薬局方

エナラプリルマレイン酸塩錠

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」

エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「トーフ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。
 なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要する場合がございますので、
 今後のご使用に際しましては、下記内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

改訂後（下線部改訂）			改訂前（点線部削除）		
3. 相互作用 2) 併用注意(併用に注意すること)			3. 相互作用 2) 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤 スピロラクトン トリアムテレン カリウム補給剤 塩化カリウム <u>トリメトプリム含有製剤</u> <u>スルファメトキサゾール・トリメトプリム</u>	血清カリウム値が上昇することがある。	本剤はアルドステロン分泌抑制に基づく尿中へのカリウム排泄抑制作用を有するため、併用によりカリウム貯留作用が増強する。腎機能障害のある患者には特に注意すること。	カリウム保持性利尿剤 スピロラクトン トリアムテレン カリウム補給剤 塩化カリウム	血清カリウム値が上昇することがある。	本剤はアルドステロン分泌抑制に基づく尿中へのカリウム排泄抑制作用を有するため、併用によりカリウム貯留作用が増強する。腎機能障害のある患者には特に注意すること。
4. 副作用 1) 重大な副作用(頻度不明) (4) <u>急性腎障害</u> ：定期的に検査を実施するなど、観察を十分に行うこと。			4. 副作用 1) 重大な副作用(頻度不明) (4) <u>急性腎不全</u> ：定期的に検査を実施するなど、観察を十分に行うこと。		

該当項目のみ記載

2. 改訂理由

「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

相互作用の相手薬剤と整合性をとるため、「相互作用 併用注意」の項を改訂し、注意喚起致しました。

「副作用 重大な副作用」の項（自主改訂）

記載整備致しました。

「急性腎不全」→「急性腎障害」

<参考>

医薬品・医療機器等安全性情報No. 341 (<http://www.pmda.go.jp/files/000216852.pdf>)

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No. 272（2018年8月）に掲載される予定です。

また、改訂後の添付文書全文につきましては、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<http://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載致します。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932