

副作用について

- この薬を飲むと、吐き気、食欲減退、眠気、喉が渇く、頭痛などの副作用があらわれることがあります。これらの症状は、特に飲み始めの時期にあらわれることが多く、体が薬に慣れることで軽減することがあります。症状がひどい場合や、このほかにも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- まれに、次のような症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれたら、服用を中止して、すぐに医師に連絡してください。
 - ▶ **肝機能障害** (からだのだるい、吐き気、嘔吐など)
 - ▶ **黄疸** (白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなるなど)
 - ▶ **肝不全** (吐き気、嘔吐、食欲不振、羽ばたくような手のふるえなど)
 - ▶ **アナフィラキシー** (じんましん、眼と口唇のまわりのはれなど)
- 眠気、めまいなどを起こすことがありますので、自動車の運転などの危険を伴う操作を行わないようにしてください。

その他の注意

- この薬の服用前および服用中は、定期的に血圧及び心拍数(脈拍数)の測定が行われます。
- 他の診療科を受診するときは、この薬を服用中であることを必ず伝えてください。

保管について

- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。
- 直射日光と湿気を避けて室温で保管してください。

東和薬品株式会社

この薬について

- この薬は、一定の期間服用することで、注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の主な症状である「不注意」、「多動性」、「衝動性」の改善が期待できます。
- この薬は、徐々に増量し、適切な服用量(維持量)にします。医師に指示された用法・用量を守り、正しく服用してください。自分の判断で服用を止めたり、薬の量を増やしたりしないでください。

服用するときの注意

- この薬の成分は、目への刺激性があります。
- 錠剤の破片や液剤が目に入った場合は、すぐに水で洗って医師に相談してください。また、手についた場合は、すぐに手を洗ってください。

錠剤を服用される方へ

錠剤を分割したり、粉砕したりせず、そのまま飲んでください。

服用中の注意

- この薬を服用中に以下の症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に連絡してください。
 - ▶ **攻撃的な行為や態度、またはこれらの症状の悪化**
 - ▶ **死にたいと考える、または関連する行動**
 - ▶ **幻覚や幻聴**

中面に薬のチェックシートがあります。飲み忘れないように記録しましょう。

薬のチェックシート

飲み忘れを防ぐため、飲み始めてからしばらくの間は薬のチェックシートで服用を記録しましょう。

記入例

服用日付を書きましょう。

日付	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26
服用	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕

1日2回服用の方は、朝・夕の服用ごとに○をつけてください。

1日1回服用の方は、ご自分の服用時間に近いほうに○をつけてください。

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕

日付	/	/	/	/	/	/	/
服用	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕