

トアラセット配合錠「トローワ」を服用される方へ

この薬には、トラマドールとアセトアミノフェンという痛みをおさえる2つの有効成分が配合されています。

この薬は、これらの成分が含まれている他の薬と一緒に服用しないでください。特にアセトアミノフェンは、痛み止めや風邪薬に含まれていることがありますので、ご自分で薬局から買って飲む際には、医師または薬剤師に相談してください。

服用時の注意

- 医師の指示通りに服用してください。
- 服用間隔は4時間以上空けてください。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 飲酒は避けてください。多量のアルコールによって副作用が出やすくなります。

**自分の判断で増量・減量したり、中止したりせず、
医師の指示通りに服用しましょう。**

(裏面もお読みください)

副作用について

● 吐き気・嘔吐

飲み始めの時期にあらわれることがあります。しばらくするとなくなることが多いですが、おさまらない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

● 便秘

飲み始めの時期からあらわれることがあります。症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

● 眠気

飲み始めの時期にあらわれることがあります。しばらくするとなくなることが多いですが、眠気がとれない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

この薬を飲んでいるときは、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作はしないでください。

このほかにも、何か気になることがありましたら、医師または薬剤師に相談してください。

保管について

- 誤って飲んでしまわないよう、乳幼児、子どもの手の届かないところに保管してください。
- 薬が残った場合は、保管せず廃棄してください。
- **他の人には絶対に渡さないでください。**

東和薬品株式会社