

ミルタザピン錠・OD錠「トローワ」を 服用される方とご家族の方へ

薬の服用について

- 症状を改善するために、決められた量の薬を続けて服用することが大切です。
- この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると、些細なことでも心配になる、いろいろな、あせるなどの症状があらわれることがあります。指示通りに飲み続けることが重要です。

気になる症状がある場合は

- この薬を飲むと、眠くなる、口が渇く、身体がだるくなるなどの副作用があらわれることがあります。症状が辛い場合は、自己判断で薬の服用を止めずに、医師または薬剤師に相談してください。
- この他にも気になる症状があらわれた場合は医師または薬剤師にご相談ください。



18歳未満の患者さんの服用に関する注意点

- 7～17歳の大うつ病性障害のある人がこの薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。18歳未満の大うつ病性障害のある人は、医師と十分に相談してください。

(裏面もお読みください)

服用中に注意する症状について

- うつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと感じることがあります。この薬を飲んでいる間、特に飲みはじめや飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがあるので、このような症状があらわれた場合には、医師に相談してください。
- 不安になる、いらいらする、あせる、興奮しやすい、発作的にパニック状態になる、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、敵意を持つ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができない、などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合には、医師に相談してください。この薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもととある病気の症状が悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。

ご家族の方のサポート

- ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さんの行動の変化やうつ症状などのもととある病気の症状が悪化する危険性について医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。また、患者さんご自身も病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

その他の注意

- この薬を飲むと、眠気・めまい等があらわれることがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は避けてください。
- 薬の効果に影響しますので、飲酒は控えてください。
- 他の医師を受診するときや、薬局などで他の薬を購入するときは、この薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

東和薬品株式会社