

骨ページェット病の患者さんへ

リセドロン酸Na錠17.5mg「トーフ」の飲み方

この薬は毎日1回1錠8週間飲む薬です。

毎日1回1錠を下記の手順で飲んでください。

朝、起きたとき(食事前)

に、1錠を**コップ1杯**
(約180mL)の**水**^{注)}
で飲んでください。



注) 水道水や市販の水(Ca、Mg等の
含量の特に高いミネラルウオー
ターを除く)で飲んでください。

飲んでから**30分間は**
横にならず、水以外の
飲食、他の薬の服用は
さけてください。



この薬をかんだり、
口の中で溶かしたりしないでください。

薬を飲み忘れたとき

何か飲食物を**とったり**、
他の薬を**飲んだ**場合



翌朝に1錠
飲んでください。

何も飲食物を**とっておらず**、
他の薬も**飲んでいない**場合



すぐに飲んでください。
飲んでから30分間は横にならず、
水以外の飲食、他の薬の服用は
さけてください。

裏面もお読みください。

この薬の服用により、以下のような症状があらわれることがあります。

- 食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じる など
- あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき など
- 外耳炎、耳だれ、耳の痛みが続く など
- 太ももや太ももの付け根の痛み
- 体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなる など

このような症状があらわれたり、異常を感じた場合は、すみやかに医師または薬剤師に相談してください。

この薬のようなビスホスホネート系薬剤によるあごの骨の異常についての報告の多くは、薬を服用中に抜歯した場合や歯のインプラント*をした場合に発生しています。

歯科治療を受けられる方は、必ず歯科医、口腔外科医にこの薬を服用していることをお申し出ください。

*入れ歯とは異なり、人工的な歯の根をあごに埋めて、その上に人工の歯を取り付ける治療方法です。