

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2019年1月

東和薬品株式会社

経口抗凝血剤

日本薬局方

ワルファリンカリウム錠

ワルファリンK錠0.5mg「トーフ」

ワルファリンK錠1mg「トーフ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、改訂内容にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (_____ : 追記、 _____ : 削除)

改訂後			改訂前		
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 9) ミコナゾール（ゲル剤・注射剤・錠剤）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）			【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 9) ミコナゾール（ゲル剤・注射剤）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）		
3. 相互作用 1) 併用禁忌（併用しないこと）			3. 相互作用 1) 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ミコナゾール（ゲル剤・注射剤・錠剤） フロリドゲル経口用 フロリドF注 オラビ錠口腔用	本剤の作用を増強することがある。また、併用中止後も、本剤の作用が遷延し、出血やINR上昇に至ったとの報告もある。 患者が本剤による治療を必要とする場合、本剤による治療を優先し、ミコナゾール（ゲル剤・注射剤・錠剤）を投与しないこと。	(省略: 現行のとおり)	ミコナゾール（ゲル剤・注射剤） フロリドゲル経口用 フロリドF注	本剤の作用を増強することがある。また、併用中止後も、本剤の作用が遷延し、出血やINR上昇に至ったとの報告もある。 患者が本剤による治療を必要とする場合、本剤による治療を優先し、ミコナゾール（ゲル剤・注射剤）を投与しないこと。	(省略)

改訂後				改訂前			
3. 相互作用 2) 併用注意(併用に注意すること)				3. 相互作用 2) 併用注意(併用に注意すること)			
薬効分類	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬効分類	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
解熱鎮痛消炎剤	(省略:現行のとおり) スリンダク ナブメトン (省略:現行のとおり)	(省略:現行のとおり)	(省略:現行のとおり)	解熱鎮痛消炎剤	(省略) スリンダク テノキシカム ナブメトン (省略)	(省略)	(省略)
	アレルギー用薬	トラニラスト	(省略:現行のとおり)		(省略:現行のとおり)	ザフィルルカスト	(省略)
	オザグレル塩酸塩水和物	(省略:現行のとおり)	(省略:現行のとおり)	トラニラスト	(省略)		
				オザグレル塩酸塩水和物	(省略)	(省略)	

2. 改訂理由

「禁忌」「相互作用 併用禁忌」「相互作用 併用注意」の項（自主改訂）

相互作用の相手薬剤と整合性をとるため、「禁忌」「相互作用 併用禁忌」「相互作用 併用注意」の項を改訂いたしました。

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会の医薬品安全対策情報（DSU）No.276（2019年1月）に掲載の予定です。

また、最新添付文書は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）及び弊社「東和薬品医療関係者向けサイト」（<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/>）に掲載いたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

【製品情報お問い合わせ先】

学術部DIセンター

☎0120-108-932