

カペシタビン錠「トーフ」を服用されている方へ


服用方法

1日2回(朝食後と夕食後それぞれ30分以内)に服用してください。
服用するスケジュールは患者さんによって異なりますので、必ず
指示された服用スケジュールに従ってください。


あなたの服用スケジュール

下記の☑のついたスケジュールを1コースとして繰り返します。

14日間毎日服用し、その後7日間服用を休みます



21日間毎日服用し、その後7日間服用を休みます



5日間毎日服用し、その後2日間服用を休みます



医師の指示なしに、自分の判断で服用を止めたり、服用スケジュールを変更したりしないでください。

裏面も必ずご覧ください

絶対に一緒に服用してはいけない薬

- テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(ティーエスワン®など)

※服用中止後も7日間はカペシタビン錠「トーフ」は飲めません。

飲み合わせに注意する薬

- ワルファリンカリウム(血液を固まりにくくする薬)
- フェニトイン(てんかんの薬)
- トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(抗がん薬)

副作用

次の症状が見られたときは医師または薬剤師に連絡してください。

● 発熱・感染症

- ・38度以上の熱



● 下痢

- ・激しい下痢
- ・水のような便
- ・頻回の軟便



● 吐き気・嘔吐

- ・長く続く吐き気
- ・頻回の嘔吐



● 手足症候群

手や足に下記のような症状が現れる

- ・ヒリヒリ、チクチク感
- ・赤み、腫れ
- ・水疱、ひび割れ
- ・痛み※

※痛みがあるときはすぐに服用をやめてください。



● 口内炎

- ・痛み・発赤
- ・腫れやただれ

● 出血

- ・鼻血・歯ぐきの出血
- ・あおあざ

このほかにも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談して下さい。