

# ブロナンセリン錠「トーフ」を 服用されている方とご家族の方へ

## この薬について

- この薬は、食事のあとに飲んでください。空腹時に飲むと効き目が弱くなることがあります。
- この薬は、徐々に飲む量を増やしながら、患者さんに必要な量を調整していきます。
- この薬は、毎日飲み続けることが大切です。自分の判断で、服用量や服用する回数を増やしたり減らしたり、服用を中止したりせずに、医師の指示通りに飲んでください。


## 服用中にはしてはいけないこと

- この薬の服用中は、眠気や注意力・集中力・反射能力などの低下が起こることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
- アルコール飲料はこの薬の作用を強めることがありますので、控えてください。
- グレープフルーツジュースによって、この薬の作用が強くあらわれることがあります。一緒に飲まないでください。

(裏面もお読みください)

## 服用中に注意すること

- この薬を服用すると、症状が悪化したり、手足のふるえ、じっとしていられない、不眠などの症状があらわれたりすることがあります。このような症状があらわれたり、いつもと違うと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。



- この薬を服用すると、血糖値が上昇することがあります。
  - 以前よりものが渇く、水などを多く飲む、尿が多く出る、尿の回数が増える、などの症状があらわれた場合は、服用を中止し、ただちに受診してください。
  - 糖尿病の方や過去に糖尿病になったことがある方、高血糖や肥満傾向の方、家族に糖尿病の方がいる方は、定期的に血糖値を測定する場合があります。

## 保管上の注意

- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。

東和薬品株式会社