

レビー小体型認知症で ドネペジルOD錠／錠／内用液「トーフ」を 服用される方とご家族・介護者の方へ

この薬について

- この薬はレビー小体型認知症の症状の進行を遅らせる薬です。
- 医師の指示に従って、決められた量を服用してください。

最初の1～2週間は**1日1回3mg**を服用します。

その後、**1日1回5mg**を服用します。

5mgを4週間以上継続した後に
1日1回10mgに増量します。

- この薬は1日1回服用してください。
- 飲み忘れても、次の日に2日分を一度に服用しないでください。
- 過量に飲んでしまった場合は直ちに医師または薬剤師へ連絡してください。
- 症状に変化が見られなくても、患者さん本人や家族の判断で服用を中止したり、量を変更したりしないでください。

(裏面もお読みください)

服用にあたっての注意事項

- 次のような症状があらわれたり、いつもと違うと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。
 - 軽い吐き気、食欲不振、便が軟らかくなる
 - パーキンソン症状が悪化する

パーキンソン症状とは



- レビー小体型認知症では、自動車の運転などの機械操作能力が低下する可能性があります。また、薬によって、意識障害、めまい、眠気などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。

保管上の注意

- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。
- 湿気を避けて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。