


その他の注意

- この薬の服用中は不正性器出血や上腹部の痛み、乳房の張りなどがあらわれる場合があります。症状がひどい場合や長く続く場合には、医師または薬剤師に相談してください。
- 次のような場合も医師または薬剤師に相談してください。
 - 2周期連続して月経のような出血が来ないとき
 - 妊娠を希望するとき
 - 他の薬を飲むときや手術の予定があるとき

- 他の診療科、医療機関を受診する際には、<フリウェル配合錠「トーフ」を服用している方へ(患者携帯カード)>を提示するなど、この薬を飲んでいることを医師に伝えてください。



- 禁煙してください。喫煙により静脈血栓症、肺塞栓症、心筋梗塞、脳卒中などの副作用の危険性が増すという報告があります。
- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保管してください。
- 気になることやわからないことがある場合は医師または薬剤師に相談してください。



東和薬品株式会社

2019年3月作成(C-1)



フリウェル配合錠「トーフ」 を服用される方へ



この薬は月経困難症の治療薬です。

この薬の飲み方

- この薬を初めて飲むときは、月経の第1～5日目から飲みはじめてください。
- 1日1錠を毎日一定の時刻に飲んでください。
- 1～3週目の21日間連続して飲みます。
- その後4週目の7日間飲むのを休みます。
- 4週間(28日間)を1周期として同様の方法で、繰り返します。4週間が終わったら、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、翌日(29日目)から新しいシートの薬を飲みはじめてください。



- この薬の服用を中止する場合は、医師に相談してください。

飲み忘れたとき

- 飲み忘れた場合は、気づいた時点で前日分(2日以上飲み忘れた場合も前日分のみ)の1錠を飲み、当日の錠剤も通常の時刻に飲んでください。服用後は初めの服用スケジュール通り継続して飲んでください。

1日分(1錠)飲み忘れた場合



前々日	前日	当日	翌日
☉	飲み忘れ	☉ ☉ ☉	

2日以上飲み忘れた場合


前々日	前日	当日	翌日
飲み忘れ	飲み忘れ	☉ ☉ ☉	

専用ケースのセットの仕方

- ① ケースを広げて矢印の部分に PTPシートを裏向きにセットします。 ② セットした部分を折り曲げ PTPシートを挟みます。




- ③ 手で押さえて固定し、上部に服用開始日と曜日を記入します。 ④ カバー部分を折り曲げます。



イラストはフリウェル配合錠ULD「トローワ」専用ケースですが、フリウェル配合錠LD「トローワ」専用ケースも同様となります。

4週目の7日間は飲むのを休みます。忘れないようにこの部分をめぐりましょう。



血栓症について

- この薬を飲むと**血栓症（血管内に血のかたまりが詰まる病気）**が起こることがあります。次のような症状があらわれた場合は、**飲むのをやめてすぐに救急医療機関を受診してください。**

突然の足の痛み・腫れ
手足の脱力・まひ
突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
突然の視力障害（見えにくいところがある、視野が狭くなる）など

- 次のような症状があらわれた場合は血栓症の疑いがあります。症状が軽くても**飲むのをやめてすぐに医師に相談してください。**

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、
頭痛、嘔吐（おうと）・吐き気 など

- 次のような状態になった場合、**飲むのをやめてすぐに医師に相談してください。**

体を動かさない、脱水 など

- 長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなります。

適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

- この薬による治療を行っている間は、副作用の早期発見のためにも**定期的**に受診しましょう。

