



小児期ADHD(18歳未満)

アトモキシチン「トローワ」を 服用される方とご家族の方へ

監修 医療法人翠星会 松田病院 院長 松田 文雄 先生



ADHDとは


ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) は、日本語で「注意欠如・多動症」といいます。気が散ってしまうなどの「不注意」、じっとしていられないなどの「多動性」、思いついたらすぐ行動してしまうなどの「衝動性」といった症状がみられます。ADHDは性格や育て方が原因ではなく、脳の働きと関係があると考えられています。



アトモキセチン「トーワ」の作用の仕組み

脳では、神経細胞同士が情報を伝えるために「神経伝達物質」が働いています。ADHDの患者さんでは、この神経伝達物質が少なくなっており、脳の働きに問題が起こっていると考えられています。アトモキセチンは、神経伝達物質の量を増やすことで、ADHDの症状を改善します。

脳内 (前頭前野) のアトモキセチンの作用



アトモセチン「トーフ」には 錠剤（4種類）と内用液があります

お子さんの体重や治療段階に合わせて、アトモセチンの服用量を調節します。きめ細かい調節を行うため、内用液と4種類の錠剤を用意しています。それぞれに含まれる有効成分の量が異なりますので、医師に指示された用法・用量を守り、正しく服用してください。

内用液



	有効成分の量	製剤写真
アトモセチン内用液0.4%「トーフ」	1mL中に 4mg	

錠 剤



	有効成分の量	製剤写真
アトモセチン錠5mg「トーフ」	5mg	
アトモセチン錠10mg「トーフ」	10mg	
アトモセチン錠25mg「トーフ」	25mg	
アトモセチン錠40mg「トーフ」	40mg	

原寸大

アトモセチン「トーフ」の飲み方


- アトモセチンは1日2回服用するくすりです。
- なるべく食後すぐに飲んでください。

アトモセチンは飲み始めから徐々に量を増やし、3段階にかけて適切な服用量（維持量）にします。医師に指示された服用量・服用方法を守り、正しく服用してください。

【医師に指示されたくすりの飲み方について】

内用液を飲む方は、p.20の『**内用液の飲み方**』に服用量などを記入しましょう。

錠剤を飲む方は、p.21の『**錠剤の飲み方**』に服用量などを記入しましょう。



- 増量するときは1週間以上かけて増やしていくのが一般的です。
- 6歳未満の患者における有効性および安全性は確かめられていません。

アトモセチンの治療を受ける前の チェック事項

以下に該当する項目がある場合は、服用する前に医師または薬剤師に伝えてください。

以下のいずれかに該当する方はアトモセチンを飲むことができません

- ☐ アトモセチンに対し薬物アレルギーなど過敏な反応を経験したことがある方
- ☐ モノアミンオキシダーゼ (MAO) 阻害剤 (セレギリン、ラサギリン、サフィナミド) を飲んでいて、あるいは飲むのをやめてから2週間以内の方
- ☐ 心血管に重篤な障害のある方
- ☐ 褐色細胞腫の診断を受けている、または以前に受けたことがある方
- ☐ 閉塞隅角緑内障の方

以下のいずれかに該当する方はアトモセチン服用の際に注意が必要です

- ☐ 肝臓に障害のある方
- ☐ 腎臓に障害のある方
- ☐ 痙攣発作がある、または以前におこしたことがある方
- ☐ 心疾患 (QT延長を含む) の診断を受けている、または以前に受けたことがある方
- ☐ 先天性QT延長症候群の診断を受けている、またはQT延長の診断を受けた家族がいる方
- ☐ 高血圧の診断を受けている、または以前に受けたことがある方
- ☐ 脳血管障害の診断を受けている、または以前に受けたことがある方
- ☐ 起立性低血圧の診断を以前に受けたことがある方
- ☐ 精神病性障害、双極性障害の診断を受けている方
- ☐ 排尿が困難な方

このくすりは心臓や血管に影響を与えることがあるため、服用を始める前と服用中は定期的に、血圧や心拍数 (脈拍数) の測定を行います。また、服用前に心電図の検査を行うこともあります。

服用する際の注意点①

基本的な注意

内用液を飲む方への注意

- 維持量までは徐々に量を増やします。必ず医師に指示された量を服用してください。
- ご自分の判断で服用を止めたり、くすりの量を増やしたりしないでください。
- お子さんが服用する場合は、必ず保護者の方が服用させてください。
- このくすりの成分は、目に対する刺激性があります。目に入った場合は、すぐに水で洗って医師に相談してください。また、手についた場合は、すぐに手を洗ってください。
- このくすりの服用前および服用中は、定期的に血圧および心拍数 (脈拍数) の測定が行われます。



錠剤を飲む方への注意

- 維持量までは徐々に量を増やします。必ず医師に指示された量を服用してください。
- ご自分の判断で服用を止めたり、くすりの量を増やしたりしないでください。
- 包装シート (PTPシート) から取り出して服用してください。
- このくすりの成分は、目に対する刺激性があります。錠剤の破片が目に入った場合は、すぐに水で洗って医師に相談してください。また、割れたり、砕けたりした錠剤を手で触った場合は、すぐに手を洗ってください。
- このくすりの服用前および服用中は、定期的に血圧および心拍数 (脈拍数) の測定が行われます。



服用する際の注意点②

飲み方をまちがえたとき

- 飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。決して2回分を一度に飲まないでください。
- 誤って多く飲んでしまい、普段と違う様子がみられましたら、すぐに医師に相談してください。

他の診療科、病院を受診するとき

- このくすりを服用中であることを必ず伝えてください。

くすりの管理

- くすりは処方された方のみが服用するものです。ご家族間であっても他の方は絶対に服用しないでください。
- あまったくすりの処分については、薬局や医療機関に相談してください。

注意が必要な症状変化

このくすりを服用中に

- 攻撃的な行為や態度、またはこれらの症状の悪化
- 死にたいと考える、または関連する行動
- 幻聴や幻覚

などの症状があらわれることがあります。保護者の方はお子さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には医師に相談してください。

服用する際の注意点③

アトモキシチンと一緒に服用すると効果が変わったり、副作用が発現する可能性が高くなったりするくすりがあります。現在服用しているくすりがある場合、またアトモキシチンの服用中に他のくすりを服用する場合は、事前に医師または薬剤師にご相談ください。

アトモキシチンと一緒に飲んではいけないくすり

薬剤名など	くすりの種類
セレギリン、ラサギリン、サフィナミドなど	パーキンソン病のくすり

アトモキシチンと一緒に使用するには注意が必要なくすり

薬剤名など	くすりの種類
サルブタモール（吸入剤は含まない）	喘息、気管支炎などのくすり
ベータ（ β ）受容体刺激剤	喘息、気管支炎などのくすり
パロキシチン、ミルナシプランなど	うつ病などのくすり
ドパミンなど	急性循環不全のくすり
イミプラミンなど	うつ病、おねしょなどのくすり
メチルフェニデートなど	ADHD、ナルコレプシーなどのくすり

あらわれやすい副作用

アトモセチンを服用すると、次のような副作用があらわれることがあります。

あらわれる副作用の種類や症状の程度には個人差がありますが、保護者の方はお子さんの様子を注意深く観察してください。

なお、副作用はアトモセチン服用開始時にあらわれることが多く、体が慣れるまで数週間かかることがあります。

腹痛



頭痛



吐き気



食欲低下



体重減少



眠気



これらの症状以外にも、お子さんの健康や成長なども含めて何か気になる症状がありましたら、早めに医師または薬剤師にご相談ください。

すぐに相談する必要がある副作用

服用中に次のような症状があらわれたら、くすりの服用を中止して、すぐに医師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
肝機能障害	からだがだるい、吐き気、嘔吐、食欲不振、かゆみ
黄疸	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる
肝不全	吐き気、嘔吐、食欲不振、羽ばたくような手のふるえ
アナフィラキシー	じんましん、眼と口唇のまわりのはれ、からだがだるい、ふらつき、意識の低下、考えがまとまらない、ほてり、しゃがれ声、息苦しい、息切れ、動悸、判断力の低下




アトモキセチン内用液0.4%「トーフ」 服用の手順

準備するもの

アトモキセチン内用液0.4%
「トーフ」ボトル



ピペット
(5mL)



アダプター※1



カップ※2



※1: ボトルの開封時のみ取り付けを行います。

※2: ピペットから直接飲むことが難しい場合に使用します。

- 開封した日から45日を過ぎた内用液は、服用しないでください。
- ただし、ボトルのラベルに記載されている使用期限が開封後45日より短い場合、もしくは薬剤師などから使用期限を伝えられている場合は、その使用期限を優先してください。(開封後45日以内であっても、使用期限を過ぎた内用液は服用しないでください。)

服用手順


1



お子さまの誤飲を防ぐため、お子さまには開けにくい安全キャップを採用しています。

テーブル等の平らな所にボトルをおき、プラスチックキャップ(以下、キャップ)を強く押ししながら、キャップを矢印の方向(反時計回り)に回して開けます。

2




アダプターをボトルのくちにしっかりと押し込んでください。その際に、ボトルを誤って倒さないように注意してください。一度付けたアダプターは取り外しません。

注意

- この手順はボトルの開封時のみ行います。
- お子さまが誤ってアダプターを飲み込まないように注意してください。


アトモキセチン内用液0.4%「トローワ」 服用の手順（続き）

3




ピストンが止まるまで押し下げて、中の空気を出してください。

4



ピペットをアダプターの奥まで差し込んでください。


5



ピペットが抜けないようにボトルとピペットを片方の手のひらで包み込むように握ってください。
もう一方の手でゆっくりとピストンを引いて、必要な量の薬液をとってください。


アトモキセチン内用液0.4%「トローワ」 服用の手順(続き)

6



ボトルを平らなところに置きます。
大きな気泡が入っていた場合は、ゆっくりとピストンを押し
て薬液を全て戻し、手順5から
やり直してください。

7



片方の手でボトルを持ち、アダ
プター部分を押さえながらもう
一方の手でピペットを握って
ゆっくりと取り外してください。

8



お子さまにピペットをくわえさ
せ、飲み込みやすいようにゆっ
くりとピストンを押してくだ
さい。

服用時の注意

- のどの奥までピペットを入れ
ないよう注意してください。
- 苦みがでるので、口に入れた
らすぐに飲み込ませてくだ
さい。

ピペットから直接飲むことが難
しい場合は、カップに移し替え
てそのまま飲ませてください。

カップ移し替え時の注意

- 液はねしないようにピペット
はカップの側面に付けて、
ゆっくりとピストンを押して
ください。

アトモセチン内用液0.4%「トロー」 服用の手順（続き）



A diagram of a bottle with a cap. A large black arrow points from the cap to the left, indicating the direction of removal. A curved black arrow above the cap indicates a counter-clockwise rotation.

使用後、アダプターを付けたままキャップを閉めます。
ボトルは立てたまま、直射日光の当たらないところに、室温で保管してください。

使用後はピペットを水洗いの上、自然乾燥させてください。

洗い方

- コップなどに水を満たし、ピペットで水を吸い取り、ピストンを最後まで押し切って、水を完全に外にだしてください。これを2〜3回繰り返します。
- ピストンを押し切った状態で、自然乾燥させてください。

注意

- 洗剤やお湯では洗わないで
ください。

Memo

飲み方の記載シート

内用液の飲み方

日付	年	月	日	～	年	月	日
 朝							mL/回
 夕							mL/回

日付	年	月	日	～	年	月	日
 朝							mL/回
 夕							mL/回

日付	年	月	日	～	年	月	日
 朝							mL/回
 夕							mL/回

日付	年	月	日	～	年	月	日
 朝							mL/回
 夕							mL/回

錠剤の飲み方

日付	年	月	日	～	年	月	日
	5mg	10mg	25mg	40mg			
 朝	錠	錠	錠	錠			
 夕	錠	錠	錠	錠			

日付	年	月	日	～	年	月	日
	5mg	10mg	25mg	40mg			
 朝	錠	錠	錠	錠			
 夕	錠	錠	錠	錠			

日付	年	月	日	～	年	月	日
	5mg	10mg	25mg	40mg			
 朝	錠	錠	錠	錠			
 夕	錠	錠	錠	錠			

日付	年	月	日	～	年	月	日
	5mg	10mg	25mg	40mg			
 朝	錠	錠	錠	錠			
 夕	錠	錠	錠	錠			

アトモキシチン錠/内用液「トーワ」は ジェネリック医薬品です

ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬品）の特許期間が過ぎた後に発売され、有効性・安全性が新薬と同じで、低価格の薬のことです。

錠剤

先発医薬品と同じ部分：有効性・安全性

先発医薬品と異なる部分：剤形

先発医薬品のカプセル剤に対して錠剤を新たに開発しました。カプセル剤と錠剤の有効性・安全性は変わりません。

＜アトモキシチン錠「トーワ」5mg/10mg/25mg/40mg＞



内用液

先発医薬品と同じ部分：有効性・安全性

先発医薬品と異なる部分：風味

＜アトモキシチン内用液0.4%「トーワ」＞



緊急の連絡先

病院・医院名

電話番号

担当医師名

科

お問い合わせ窓口

memo

発行：2021年
監修：医療法人翠星会 松田病院 院長
松田 文雄
提供：東和薬品株式会社

本冊子の内容を許可なしに複製、複写（コピーなど）、転載することは法律で認められた場合を除き禁じられています。